

Pression artérielle Test Préliminaire - Test préliminaire

Test préliminaire

(Vous pouvez trouver les réponses dans le contexte)

1. Dans la méthode d'auscultation de mesure de la pression artérielle, quel est l'indicateur de la pression systolique?

- Réponse
- Le volume maximal des bruits.
 - La première détection des bruits.
 - La disparition des bruits.

2. Dans la méthode d'auscultation de mesure de la pression artérielle, quel est l'indicateur de la pression diastolique?

- Réponse
- Le volume maximal des bruits.
 - La première détection des bruits.
 - La disparition des bruits.

3. Quelle est la cause des bruits connus sous le nom de bruits de Korotkoff?

- Réponse
- Le flux sanguin laminaire.
 - Le flux sanguin turbulent.
 - Le flux sanguin maximal.

4. Selon vous, laquelle des affirmations ci-dessous, sur le détecteur de pouls du doigt, est vraie, s'il est utilisé conjointement avec un sphygmomanomètre?

- Réponse
- Il ne peut pas être utilisé pour déterminer la pression diastolique.
 - Il peut être utilisé pour déterminer la pression diastolique.
 - Il ne peut pas être utilisé pour déterminer la pression systolique.

5. Que devrait être la pression systolique mesurée avec le bras levé au dessus de la tête?

- Réponse
- La même que celle mesurée avec le bras en position normale.
 - Plus élevée que celle mesurée avec le bras en position normale.
 - Plus basse que celle mesurée avec le bras en position normale.

6. Les termes systole et diastole se réfèrent habituellement à la _____ et à la _____, respectivement, des _____.

- Réponse
- relaxation, contraction, ventricules
 - contraction, relaxation, ventricules
 - relaxation, contraction, atria
 - contraction, relaxation, atria
 - aucun mentionné ci-dessus.