

VI. Epidémiologie : santé des français

3. Morbidité

Données disponibles

- **Surveillance en population générale**

Registres de maladies : cancers, maladies cardiovasc., malf. congénitales

Déclaration obligatoire de certaines maladies

Certificats de santé des enfants, réseaux de laboratoires

- **Vigilances** : médicaments, dispositifs médicaux, produits sanguins etc

Données des systèmes de vigilances

- **Surveillance liée aux recours aux soins / protection sociale**

Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information

Système National des Données de Santé ; Affections de Longue Durée

- **Etudes spécifiques**

Pathologies cardiovasculaires

- **Cardiopathies ischémiques** : de l'angor stable au syndrome coronaire aigu
 - Insuffisance d'apports d'oxygène au muscle cardiaque (athérosclérose)
 - Facteurs de risque : tabagisme, hypercholestérolémie, diabète, obésité, hypertension, stress, sédentarité
 - Plus de 220 000 patients hospitalisés pour une cardiopathie ischémique (2014)
 - Mortalité en France :
 - 2^{ème} cause de décès chez les hommes et les femmes
 - Diminution de la mortalité : prévention et amélioration thérapeutique
 - Taux de mortalité le plus bas de l'UE

Pathologies cardiovasculaires

- **Accidents vasculaires cérébraux** : hémorragique / ischémique
 - Facteurs de risque : hypertension artérielle, tabagisme, hypercholestérolémie, diabète, troubles du rythme, obésité et antécédents personnels et familiaux de maladies cardio-vasculaires
 - Plus de 110 000 patients hospitalisés pour un AVC (2014)
 - 1^{ère} cause de décès chez les femmes / 3^{ème} cause chez les hommes
 - Diminution de la mortalité depuis le début des années 2000
 - 1^{ère} cause de handicap moteur non traumatique
 - 2^{ème} cause de démence

Pathologies cardiovasculaires

- **Hypertension artérielle**

- Un des principaux facteurs de risque cardiovasculaires
- Risque : AVC, cardiopathie ischémique, artériopathie des membres inférieurs, insuffisance rénale chronique
- Prévalence : 31% (18-74 ans)

- **Insuffisance cardiaque**

- Fréquemment : complication d'une maladie cardiaque antérieure
- Prévalence : 2,3% de la population française
- Plus de 165 000 patients hospitalisés avec un diagnostic d'insuffisance card.
- 70 000 décès en 2013 ; diminution de la mortalité depuis années 2000

Pathologies cardiovasculaires

- **Maladie thrombo-embolique veineuse**

- Thrombose veineuse périphérique, embolie pulmonaire

- Facteurs de risque :

Cancer, chirurgie, immobilisation, troubles de la coagulation, obésité, grossesse, certains traitements hormonaux

- Incidence en augmentation (avant 65 ans, hommes) :

Rôle de l'amélioration des tests diagnostics, meilleure survie des

polytraumatisés, des patients atteints de cancer, augmentation de l'obésité

Santé mentale

- **Suicides / tentatives de suicides**

- Plus de 9600 décès par suicides (15,5 pour 100 000) en 2013

Taux plus élevés chez les hommes et les personnes âgées

Diminution des taux de suicide depuis le début des années 2000

Pendaison (65%), arme à feu (14%), médicaments / autres subst. (11%)

France : taux élevé de suicide en Europe

- Plus de 91 000 séjours hospitaliers pour TS

0,8% de TS déclarées lors 12 derniers mois (Baromètre Santé 2014)

Santé mentale

- **Troubles psychotiques**

- Schizophrénie, troubles psychotiques aigus, troubles schizotypiques, troubles schizo-affectifs, troubles délirants persistants, psychoses non organiques non précisées
- Risque de désinsertion familiale, professionnelle et sociale, suicide comorbidités somatiques, iatrogènes conduites addictives
- Incapacité, souffrance, exclusion
- Troubles psychotiques : 7,4 pour 1000 en France (2014)

Santé mentale

- **Troubles de l'humeur** : troubles bipolaires / troubles dépressifs
 - Principale pathologie prise en charge en établissements de santé spécialisés
 - Episodes dépressifs :
Prévalence : 7,5% (15-85 ans)
350 000 patients hospitalisés / suivis en ambulatoire (2014)
 - Troubles bipolaires :
Prévalence : de 0,2% à 1,6%
216 000 patients pris en charge (2014)

Quiz

Quelles sont les affirmations exactes ?

- A. Le taux de suicide est moins élevé parmi la population la plus âgée
- B. Les troubles de l'humeur représentent la principale pathologie prise en charge en établissements de santé spécialisés
- C. La prévalence des épisodes dépressifs est inférieure à 1%
- D. Les accidents vasculaires cérébraux représentent la 1^{ère} cause de handicap moteur non traumatique
- E. Plus de 220 000 patients ont été hospitalisés en 2014 pour une cardiopathie ischémique

Mentions légales

L'ensemble de ce document relève des législations française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction de tout ou partie sont réservés pour les textes ainsi que pour l'ensemble des documents iconographiques, photographiques, vidéos et sonores.

Ce document est interdit à la vente ou à la location. Sa diffusion, duplication, mise à disposition du public (sous quelque forme ou support que ce soit), mise en réseau, partielles ou totales, sont strictement réservées aux Instituts de Formation en Soins Infirmiers de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

L'utilisation de ce document est strictement réservée à l'usage privé des étudiants inscrits dans les Instituts de Formation en Soins Infirmiers de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et non destinée à une utilisation collective, gratuite ou payante.