

UE 2.6 Processus Psychopathologiques

Pédopsychiatrie TCA 2

Pr. Nicolas Georgieff
Chef pôle PEA Vinatier

Critères nosographiques

L'ANOREXIE MENTALE

Critères DSM IV de l'anorexie mentale

1. Refus de maintenir le poids corporel au niveau ou au-dessus d'un poids minimum normal pour l'âge et la taille.
2. Peur intense de prendre du poids ou de devenir gros, alors que le poids est inférieur à la normale.
3. Altération de la perception de son poids ou de sa silhouette corporelle, influence excessive du poids ou de la silhouette corporelle sur l'estime de soi, ou déni de la gravité de la maigreur actuelle.
4. Chez les femmes pubères, aménorrhée, c'est-à-dire absence d'au moins trois cycles menstruels consécutifs.

Type restrictif : le sujet ne présente pas de crises de boulimie ni de méthodes de contrôle du poids de type vomissements provoqués ou d'abus de purgatifs (laxatifs, diurétiques, lavements)

Type boulimique : pendant l'épisode d'anorexie mentale, le sujet a régulièrement présenté des crises de boulimie ou utilisé des méthodes de contrôle du poids de type vomissements provoqués ou d'abus de purgatifs (laxatifs, diurétiques, lavements)



BMI = Body Mass Index = Poids/(Taille)² = 21

Si < 17,5 : anorexie

Pour les très jeunes anorexiques, il est important de se reporter sur les courbes de croissance

LE PASSAGE DE L'ANOREXIE À LA BOULIMIE EST FRÉQUENT



LA BOULIMIE NERVEUSE

Critères DSM IV de la boulimie nerveuse

1. Survenue récurrente de crises de boulimie : absorption, en une période de temps limitée d'une grande quantité de nourriture et associée au sentiment de perte de contrôle sur le comportement alimentaire pendant la crise.
2. Comportements compensatoires inappropriés et récurrents visant à prévenir la prise de poids, tels que : vomissements provoqués, abus de laxatifs, diurétiques, lavements ou autres médicaments, jeûne, exercice physique excessif.
3. Les crises surviennent, ≥ 2 fois par semaine pendant 3 mois.
4. L'estime de soi est influencée de manière excessive par la silhouette et par le poids corporel.
5. Le trouble ne survient pas exclusivement au cours d'épisodes d'anorexie mentale.

Type avec vomissements ou prise de purgatifs ("purging type")

Type sans vomissements ni prise de purgatifs ("nonpurging type")

L'ANOREXIE MENTALE

- Âge de début moyen : 14 ans
- 44 % évoluent vers la boulimie
- 9 filles pour 1 garçon

LA BOULIMIE NERVEUSE

- Âge de début moyen : 18 ans
- Patiente avec poids normal la plupart du temps
- 50 à 60 % ont une histoire d'anorexie dans le passé
- 7 à 8 filles pour 1 garçon



Critères DSM IV

- Trouble alimentaire non spécifié
- Hyperphagie boulimique

Université Claude Bernard Lyon 1



Réalisation technique : Service ICAP - Université Claude Bernard Lyon 1
Soutien financier : Région Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre de l'UNR-RA