


1. Autre anticoagulant → AOD


Relais d'un anticoagulant parentéral par Apixaban (ELIQUIS®), Dabigatran (PRADAXA®) ou Rivaroxaban (XARELTO®) :



Le traitement par AOD doit être débuté :

- à l'heure prévue pour l'administration suivante de l'anticoagulant parentéral
- au moment de l'arrêt de l'anticoagulant parentéral en cas d'administration continue

Relais d'un AVK par Apixaban (ELIQUIS®), Dabigatran (PRADAXA®) ou Rivaroxaban (XARELTO®) :



Le traitement par un AVK doit d'abord être interrompu.

- Dans la prévention des AVC et des embolies systémiques (**FANV**), l'AOD est débuté dès que l'INR est :
 - $\leq 3,0$ pour Rivaroxaban
 - $< 2,0$ pour Apixaban et Dabigatran
- Dans le traitement des TVP/EP et en prévention des récurrences (**TVP/EP**), l'AOD est débuté dès que l'INR est :
 - $\leq 2,5$ pour Rivaroxaban
 - $< 2,0$ pour Apixaban et Dabigatran


2. AOD → AOD



Le traitement par un nouvel AOD doit être débuté à l'heure prévue de la prochaine dose du premier AOD.


3. AOD → autre anticoagulant

Relais d'un AOD par un anticoagulant parentéral :



Le traitement par anticoagulant parentéral doit être débuté à l'heure prévue de la prochaine dose de l'AOD.


Relais de l'Apixaban (ELIQUIS®) ou du Rivaroxaban (XARELTO®) par un AVK :



Le traitement par AVK est débuté au moins 2 jours avant l'arrêt prévu de l'AOD.
L'AOD est arrêté quand l'INR est ≥ 2 .

Le résultat d'INR pouvant être perturbé par la prise d'AOD, il est recommandé d'effectuer le prélèvement pour la mesure de l'INR à distance maximale de la dernière dose d'AOD (soit juste avant la prise suivante de l'AOD).

Relais du Dabigatran (PRADAXA®) par un AVK :



L'initiation d'un traitement par AVK doit être adaptée en fonction de la clairance rénale :

- $ClCr \geq 50$ mL/min : AVK à débiter 3 jours avant l'arrêt prévu du Dabigatran
- $30 \leq ClCr < 50$ mL/min : AVK à débiter 2 jours avant l'arrêt prévu du Dabigatran

Le résultat d'INR pouvant être perturbé par la prise d'AOD, il est recommandé d'effectuer le prélèvement pour la mesure de l'INR à distance maximale de la dernière dose d'AOD (soit juste avant la prise suivante de l'AOD).