

TD 0 : ÉCHAUFFEMENT

Pour commencer, nous vous présentons trois sommes à connaître :

— somme des premiers entiers : pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2} ;$$

— somme géométrique : pour tout q réel différent de 0 et de 1, et tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=0}^n q^k = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} ;$$

— binôme de Newton : pour tous réels a et b , et tout $n \in \mathbb{N}$

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

Exercice 1

Soit $x_1 = 2$, $x_2 = 5$, $x_3 = 3$, $x_4 = 4$. Calculer les valeurs de

$$\sum_{i=1}^4 x_i, \quad \sum_{i=1}^4 6, \quad \sum_{i=1}^4 2x_i, \quad \sum_{i=1}^4 (x_i - 3), \quad \sum_{i=1}^4 x_i^2, \quad \sum_{i=1}^4 (x_i - 3)^2.$$

Exercice 2

On fixe un entier n ainsi que des réels $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ et λ . Parmi les expressions suivantes, lesquelles sont vraies ?

- (a) $\sum_{i=1}^n (\lambda + a_i) = \lambda + \sum_{i=1}^n a_i ;$
- (b) $\sum_{i=1}^n (a_i + b_i) = \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i ;$
- (c) $\sum_{i=1}^n \lambda a_i = \lambda \sum_{i=1}^n a_i ;$
- (d) $\sum_{i=1}^n (a_i b_i) = \sum_{i=1}^n a_i \times \sum_{i=1}^n b_i ;$
- (e) $\sum_{i=1}^n (a_i b_i) = \sum_{i=1}^n \left[a_i \sum_{i=1}^n b_i \right].$

Exercice 3

Soit n un entier supérieur ou égal à 2. Parmi les expressions suivantes, lesquelles sont égales à n ? Lesquelles sont différentes et pourquoi ?

$$\sum_{k=0}^n 1, \quad \sum_{k=1}^{n-1} 1, \quad \sum_{k=1}^n \frac{2k}{n}, \quad \sum_{k=0}^{n-1} \frac{2k}{n-1}, \quad \sum_{k=1}^n k - \sum_{h=0}^{n-1} h, \quad \sum_{k=n}^n 1, \quad \sum_{k=n}^n k.$$

Exercice 4

- Démontrer la relation donnant la somme géométrique présentée ci-dessus de deux manières : par récurrence, puis en multipliant la somme par $(1 - q)$.
- En déduire la factorisation de $a^n - b^n$, où n est un entier et a et b deux réels.
On pourra supposer que $a \neq 0$ et introduire $q = b/a$.

- Démontrer la relation donnant la somme S_n des premiers entiers présentée ci-dessus de trois manières :

(a) par récurrence ;

(b) compléter : $2S_n = S_n + S_n = \sum_{i=1}^n i + \sum_{j=1}^n j \stackrel{k=n+1-j}{=} \sum_{i=1}^n i + \sum_{k=\dots}^{\dots} \dots$; interpréter graphiquement ;

(c) développer $(k+1)^2 - k^2$ pour $k \in \{1, \dots, n\}$ et sommer les relations obtenues.

- (a) En utilisant à nouveau ce dernier procédé à partir de $(k+1)^3 - k^3$, calculer la somme des premiers carrés, c'est-à-dire, pour tout $n \in \mathbb{N}^2$,

$$\sum_{k=0}^n k^2.$$

(b) (Réservé aux *aficionados*.) On note T l'ensemble des couples (i, j) de $\mathbb{N}^2$ tels que

$$1 \leq j \leq i \leq n.$$

- Faire quelques dessins ($n = 1$, $n = 2$, $n = 3$, n « grand »).
- Montrer que l'application

$$f: \begin{array}{ccc} T & \longrightarrow & T \\ (i, j) & \longmapsto & (n+1-j, i-j+1) \end{array}$$

est bien définie. Calculer $f \circ f \circ f$ et en déduire que f est une bijection.

- En remarquant que l'on a $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i i = \sum_{(i,j) \in T} i$ et en utilisant f , calculer à nouveau $\sum_{i=1}^n i^2$.