Brulologie

Principes de traitement médico-chirurgical de la brûlure

Dr Hélène Person

Praticien Hospitalier, chirurgie plastique reconstructrice esthétique

Centre des Brulés Pierre Colson Lyon

Lundi 27 janvier 2025

Epidémiologie

- 400000 brûlures par an en France
- 9000 hospitalisés par an en France

- 1/3 des patients hospitalisés sont des enfants

- Accident domestique ++,
- Accident du travail, incendie, AVP

Définition, physiopathologie et complications

- **Brulure** : destruction du revêtement cutané par phénomène thermique, chimique, électrique (voire par radiation)
- Destruction **barrière** mécanique, thermique, infectieuse, hydrique, ..
- Traumatisme **local**, pouvant devenir **général**

- Réaction inflammatoire
- Dysfonction immunitaire
- Fuite capillaire et œdème interstitiel
- Hyperréactivité hormonale et métabolique

- Pertes hydro électrolytiques et protéiques
- Risque infectieux
- Hypothermie
- Dénutrition
- Œdème pulmonaire et SDRA
- Insuffisance rénale aiguë

Evaluation d'une brulure

- Agent causal
- Surface (en pourcentage de surface corporelle)
- Profondeur
- Localisation
- Lésions associées
- Contexte

Evaluation d'une brulure

- **Agent causal**

- Brulure thermique (90%) :
  - Liquides (eau, huile)
  - Flammes
  - Vapeurs
  - Corps solides (poêle, four)
  - Arc électrique
- Brulure électrique
- Brulure chimique
  - Acide
  - Base (ciment)
- (Brulure par radiation ionisante)

Evaluation d'une brulure

Evaluation d'une brulure

- Surface :

En pourcentage surface corporelle

- Regle des neuf de Wallace
- Table de Lund et Browder (enfant)
- Paume de main du patient = 1 %

Or Hand Method

Palm and fingers
of the patient =
1% TBSA

Evaluation d'une brûlure

- Profondeur :

Peau : 3 couches

Epiderme

Derme : papillaire superficiel et reticulaire profond

hypoderme

Evaluation d'une brulure

- **Profondeur**
- **1^{er} degré** : atteinte couche superficielle epiderme
- **2^e degré superficiel** : atteinte membrane basale et derme superficiel
- .....
- **2^e degré profond** : atteinte derme mais préservation d'ilots de régénération aux annexes
- **3^e degré** : atteinte de l'epiderme et du derme, sans ilot, voire atteinte plus profonde

Evaluation d'une brulure

- Profondeur
- **1^{er} degré** : coup de soleil
  - érythème **douloureux**, pas de phlyctène,
  - *ne pas compter dans la surface brulée*,
  - **cicatrisation spontanée** en quelques jours avec desquamation, pas de séquelle
- **2^e degré superficiel** :
  - phlyctènes séreuses, fond rouge ou rosé avec décoloration à la vitropression, **douleurs ++**
  - **cicatrisation spontanée** en 10-12 jours, pas de séquelle (ou minime dyschromie)
- **2^e degré profond** :
  - phlyctènes à fond blanc ou rosé pale inhomogène, **hypoesthésie**, poils résistants à la traction
  - Cicatrisation par les ilots, **avec séquelles**
- **3^e degré** :
  - lésion noirâtre, ou peau sèche cartonnée blanche, pas de décoloration à la vitro pression, anesthésie, destruction phanère ou non résistant à la traction
  - Cicatrisation par la peripherie, longue, **avec séquelles**

Evaluation d'une brulure

- Profondeur

Evaluation d'une brulure

Evaluation d'une brulure

- Profondeur :
- 1^{er} degré et 2^e degré superficiel : cicatrisation spontanée sans séquelle
- 2^e degré profond et 3^e degré : risque de séquelle, potentielle indication de **chirurgie** pour couverture par greffe de peau

Evaluation d'une brulure

- **Localisation**

sont à risque :

- face et cou,
- membre circulaire,
- périnée,
- zones articulaires

Evaluation d'une brulure

- **Lésions associées**

- lésions traumatiques
- inhalation de fumée, intoxication CO
- atteinte musculaire et cardiaque (pour brulure electrique)
- Yeux

Evaluation d'une brulure

Maltraitance / negligence
Toujours y penser
Sous diagnostiquée
Toutes les classes sociales
Interrogatoire répété / carnet / antécédents / examen clinique
complet / dossier informatique

Forced submersion in a flexed position

'Zebra' stripe

'Doughnut hole' sparing

Figure 13.5. Marks From Burns
SOURCE: Johnson (1990). Reprinted by permission of W. B. Saunders.

Facteurs Pronostiques

- Surface : > 10%
- Localisations
- Age extrêmes
- Agent causal
  - électrique, chimique, explosion, AVP, incendie milieu clos
- **UBS** : $(\% \text{ surface brulée}) + (3 * \% \text{ surface brulée au } 3^{\text{e}} \text{ degré}) > 100$
- **Score de Baux** : $\% \text{ surface brulée} + \text{age patient} > 50$
- Comorbidités

Séquelles

- Prurit, hypersensibilité cutanée
- Dyschromie, fragilité cutanée

- **Hypertrophie cicatricielle** (parfois chéloïde)
- **Rétractions et brides cutanées : manque de peau**
- Séquelles articulaires, amputations d'extrémités
- Séquelles esthétiques
- Séquelles psychologiques

S'installent dès la phase aigue

2 situations cliniques

- Grand brûlé (>30% SC ou >20%SC si <5 ans) : risque vital avant tout
- Petit brûlé : risque fonctionnel et esthétique au premier plan

Brulures typiques de l'enfant

Liquide chaud deversé, face cou décolleté et contact solide chaud, paume de main

Prise en charge initiale

Prise en charge initiale

- Enlever vêtements non adhérents, retirer bagues
- Refroidir brûlure **15° 15 min sans refroidir** le patient, ou brulstop
- (appeler 15)

- **Analgésie**
- Nettoyage, enlever tout phlyctènes, **pansement** : flammazine +/- jelonet, puis adaptation
- +/- anticoagulation
- Vérification vaccinations
- Pas d'antibiothérapie systématique

Prise en charge initiale

- Si critères de gravité : Hospitalisation
  - Perfusion et expansion volémique
  - Renutrition
  - +/- intubation, sonde à demeure
  - +/- chirurgie en urgence si profond circulaire : incisions de décharge
- Si non cicatrisé à J7 J10 : Consultation spécialisée

Prise en charge initiale

- Incision de décharge : relâcher l'effet garrot
- Pour B circulaire profonde
- Membres, tronc, cou
- prophylactique
- Au bloc opératoire

Prise en charge en aigue

Pendant hospitalisation :

- Analgésie
- Pansements /24 48h
- Hydratation si > 10% SC enfant >20% SC adulte
- Alimentation hyperprotéinée
- **Positionnement anti-oedeme puis position cutanée maximale**
- **Limiter les mouvements répétés des zones brûlées**
- **Doigts séparés** dans pansement
- Traiter prurit
- Accompagnement psychologique et social

Cicatrisation des brûlures 2^e degré profond et 3^e degré

- **Cicatrisation dirigée** par pansement
  - Détersion
  - Bourgeonnement
  - Epidermisation
- Ou **chirurgie** : greffe de peau dermo epidermique mince
  - À J12-J15 (ou J21 pour paume de main)
  - Précoce des stabilisation hemodynamique pour brûlures profondes etendues

Chirurgie : Excision - Greffe de peau

1/ Excision ou curetage des tissus non vascularisés

2/ Prelevement greffe de peau

- Autogreffe
- Peau mince
- Prelevement en peau saine sur le patient
- Avec dermatome
- 0,2 0,3 mm
- Cuisse, cuir chevelu, zone de proximité (tout sauf face)

3/ Préparation greffe de peau : Perforation ou expansion par meshage

4/ Mise en place greffe de peau : Fixation (agrafes, fils, colle chirurgicale)

Chirurgie : Excision - Greffe de peau

- site donneur :
  - Cicatrisation en 2 3 semaines (5-10 jours cuir chevelu)
  - Reprelevable lorsque cicatrisé
  - Comme « 2^e degré superficiel » : douleur (sauf cuir chevelu)
  - Laisse une trace dyschromique

Chirurgie : Excision - Greffe de peau

- Particularité du prelevement scalp
  - Indolore
  - Dyschromie cachée par la repousse
  - Cicatrisation rapide
  - Grande surface chez l'enfant

Chirurgie : Excision - Greffe de peau

Chirurgie : Excision - Greffe de peau

Chirurgie : Excision - Greffe de peau

Chirurgie : Excision - Greffe de peau

Chirurgie : Excision - Greffe de peau

Chirurgie : Excision - Greffe de peau

Chirurgie : Excision - Greffe de peau

Chirurgie : Excision - Greffe de peau

- Et pour les brûlures étendues :
- Technique sandwich avec **allogreffe** ou **xénogreffe**
- Technique d'expansion par Meek
- **Cultures de keratinocytes**
- **Dermes artificiels**

Chirurgie : Excision - Greffe de peau

- Et pour les brûlures étendues :

Maturation cicatricielle

- Durée : 1 à 2 ans (jusqu'à 4 ans)
- Phase inflammatoire marquée
- Pic à 3-6 mois

Séquelle hypertrophie

Séquelle rétraction et bride

COU

Séquelle rétraction et bride

mains

Séquelle rétraction et bride

membres

Séquelles esthétiques

Les brûlures greffées

Séquelles esthétiques

alopecies

Séquelles esthétiques

Les sites donneurs

- Objectifs de la prise en charge de la brûlure en aigue :
  - survie
  - cicatrisation
  - et **prévention des séquelles**
- Donc place primordiale de la **kinesithérapie** et de la **rééducation**
- Dès la phase aigue

Merci de votre attention