

Annale UE 2.5 S 3 : Processus inflammatoires et infectieux

Question 1 : points à relier au sujet du vocabulaire professionnel spécifique à l'immunologie

Antigène	
Hyperleucocytose	
Thrombopénie	
Inversion de formule	
Basophilie	

Question 2: Méningite

Texte à trou

L'apparition de points violacés cutanés est un signe clinique du qui est une complication de la méningite bactérienne. C'est une maladie déclaration obligatoire auprès des instances sanitaires. C'est une urgence vitale. La bactérie mise en évidence est le La prise en charge s'effectue par l'administration d'une en La méningite due à un méningocoque nécessite un isolement pour éviter le risque de transmission interhumaine. Les méningites sont bénignes et évoluent spontanément.

Question 3 VRAI FAUX :

La gravité d'une infection se mesure en fonction :

- De l'hyperleucocytose au bilan de coagulation **V/F**
- Des ATCD du patient : immunodéprimé par corticothérapie, chimiothérapie, diabète, en fonction du degré de neutropénie **V/F**
- De la réponse aux antibiotiques débutés depuis 48 jours **V/F**
- De la hausse des marqueurs de l'inflammatoire aigüe, c'est-à-dire diminution fibrinogène et vitesse de sédimentation **V/F**
- La résistance du germe aux antibiotiques prescrits **V/F**

Question 4 : Score de Quick SOFA (ou score de BAT) = critères cliniques du sepsis

Signe en lien avec une décompensation cardiaque	
Signe en lien avec une décompensation respiratoire	
Signe neurologique	

Question 5 : Surveillance des signes cutanés :

En cas de vasoconstriction périphérique, le temps de recoloration cutanée est : il est dans ce cas Des signes de gravité qui accompagnent cette vasoconstriction périphérique peuvent s'ajouter : ce sont les qui prédominent au niveau des ainsi que des extrémités

Question 6 : sur le sepsis : associer les mots à leurs définitions

Différences entre :

- Hémocue :
- Hémocult :
- Hémoculture :
- Coproculture :

Question 7 : méningite, question ouverte :

Un patient qui arrive aux urgences pour une suspicion de méningite est une urgence diagnostic et thérapeutique. Argumentez votre réponse :

Question 8 : Isolement Question ouverte :

Vous devez appliquer une prescription d'isolement contact auprès d'un patient présentant une infection urinaire à Escherichia Coli. Explicitez synthétiquement les actions que vous mettez en place ?

Question 9 : Traitement points à relier ou texte à trous :

Différencier ce qu'est un traitement curatif d'une antibioprophylaxie (vocabulaire incontournable en infectieux à connaître)

Traitement curatif	
Antibioprophylaxie	

Question 10 : traitement VRAI FAUX :

- Les antibiotiques ont une action anti bactérienne V/F
- Les antibiotiques ont une action anti virale V/F
- L'antibiotique génère un effet thérapeutique antiinfectieux afin de renforcer le système immunitaire V/F
- Ce traitement est à utiliser avec prudence car le germe peut développer des mécanismes de résistance V/F

Question 11 : au sujet des infections localisées (texte à trous)

La lymphangite est une des lymphatiques chargés de drainer une infection. Elle est consécutive à une inoculation siégeant sur le territoire drainé par les vaisseaux lymphatiques Elle peut s'accompagner d'une locorégionale. La surveillance du risque de doit être systématique dès lors que le patient est porteur d'une voie veineuse périphérique avec le respect des règles d'asepsie lors des changements de perfusion et de réfection du pansement.

Question 18 : zona/varicelle car c'est fréquent (texte à trous)

La récurrence de la varicelle se manifeste par l'apparition d'un zona, essentiellement chez la personne âgée. Il s'agit d'une portant sur l'immunité C'est une éruption cutanée qui siège sur le trajet d'un, ce qui explique la douleur. Afin de diminuer le risque de douleur et de prévenir l'apparition de douleurs post zostériennes, une prescription médicale d'..... doit être mise en place 72 heures après l'apparition de l'éruption.

Question 12 : Rôle éducatif en cas d'infection localisée, question ouverte :

Citez les règles d'hygiène primordiale afin d'éviter la croissance microbienne au niveau de la peau lors d'une infection localisée

Hygiène corporelle adaptée :

Question 13 : citez 5 facteurs de risques favorisant les infections urinaires = question ouverte

Question 14 : surveillance de l'IDE afin de prévenir le syndrome post PL = question ouverte

Question 15 : texte à trous sur l'intérêt de la trithérapie antirétrovirale

Le virus du SIDA mute
⌘

Il est donc nécessaire de prévenir les risques de aux traitements.

L'espérance de vie est si le traitement immuno-virologique est bien conduit.

L'observance du traitement doit êtreafin de prévenir les maladies opportunistes en raison du risque de rebond et par la suite de celui-ci.

Question N°13 :

Quelles sont les quatre questions essentielles à se poser face à un patient infecté ? Ces questions guident la démarche de soins infirmiers et permettent d'adapter la prise en charge aux spécificités de chaque situation infectieuse.