

UE 2.11 S5 : Wooclap TD généralités en neurologie

1) Un essai clinique est dit randomisé lorsque : cochez vrai/faux

Il existe un équilibre entre le groupe qui reçoit le médicament et celui qui reçoit le placebo

Il existe un tirage au sort des patients qui reçoivent soit le traitement soit le placebo

Les patients inclus savent qu'il s'agit d'un placebo

Le médecin choisit les patients qui reçoivent le traitement

2) Un essai clinique en double aveugle permet : cochez vrai/faux

D'avoir le même suivi pour les deux groupes analysés

D'avoir une évaluation plus objective de l'efficacité du traitement

D'assurer un suivi spécifique au niveau de certains patients

De savoir quel traitement est attribué au patient

3) Reliez les médicaments à leur antidote

Paracétamol

Morphine

Anti vit K

Les benzodiazépines

Vit K

La Naloxone

Le N-Acetylcystéine (Fluimucil)

Le Flumazenil (ou anexate)

4) Quels sont les facteurs de iatrogénie liés à la prise de traitement chez la PA

5) La prescription médicamenteuse chez l'enfant dépend de 3 critères, lesquels ?

6) Associez chaque Neurotransmetteur à son effet et ses actions

Dopamine

Gluatamte

Gaba

Motivation physique et intellectuelle, motricité

Effet inhibiteur, anxiolytique, anticonvulsivant

Effet activateur, mémoire, apprentissage, motricité

7) Dans la maladie de parkinson, l'effet on/off du traitement par L Dopa se manifeste dans la période « ON » par la disparition du blocage du mouvement : vrai/faux ?

7 bis) Dans la maladie de parkinson, l'effet on/off du traitement par L Dopa se manifeste dans la période « OFF » par une fluidité du mouvement en fin de dose médicamenteuse : vrai/faux ?

8) Les neurotransmetteurs impliqués dans la maladie de Parkinson sont :

La dopamine :

La noradrénaline :

La sérotonine :

L'acétylcholine :

9) Quelles sont les phases de la crise d'épilepsie ?

10) Associer chaque traitement à son action dans l'anesthésie

Curare

Morphinique

Hypnotique

Blocage musculaire

Perte de conscience

Analgésie

11) L'anesthésie idéale est ?

12) Parmi ces molécules, lesquelles sont des curares ?

Rocuronium

Fentanyl

Remifentanil

Suxamethonium

Midazolam

Desflurane

13) Quels sont les EI et les signes de surdosage des morphiniques ? cochez vrai/faux

Hypersudation

Nausées/vomissements

Somnolence

Hypertension

Constipation V Constipation

Hallucinations

Rétention urinaire

14) Quels sont les signes de surdosage des morphiniques ? cochez vrai/faux

– Dépression respiratoire

– Hypertension

– Myosis

– Coma

15) Par sécurité, quelle est la dilution préconisée pour la morphine ?

16) Quels sont les EI du protoxyde d'Azote ? cochez vrai/faux

HypoTA

Agitation

Céphalées

Crampes musculaires

17) Quelles sont les précautions d'emploi du protoxyde d'Azotes ? cochez vrai/faux

Dans une pièce bien ventilée

Pas plus de 60 minutes

Coucher la bouteille

Attendre que le patient s'endorme

