# SÉMIOLOGIE

*Items EDN → diarrhée chronique de l'adulte (285) et diarrhée aigüe de l'adulte (286)*

- Diarrhée : émission de plus de 3 selles molles à liquides par jour (> 300g/j)
  - Aiguë < 14 jours
  - Subaigüe: 2 à 4 semaines
  - Chronique > 4 semaines

- ≠ Polyexonération: selles fréquentes  mais de consistance et poids normaux
- ≠ Incontinence fécale

# DIFFÉRENTS TYPES DE DIARRHÉES

- Diarrhée lésionnelle

- Anomalies de la muqueuse → maladie inflammatoire de l'intestin (MICI), certaines diarrhées infectieuses (salmonelle, shigelle)

- Aspect des selles: sang, glaires
- Horaire des selles: diurne, nocturne
- Efficacité du jeûne: peu efficace



# Différents types de diarrhées

- Diarrhée sécrétoire

- Sécrétions au niveau de la muqueuse du grêle, colon → ex: colite microscopique, certaines diarrhées infectieuses (choléra)

- Aspect des selles: liquides, hydriques
- Horaire des selles: diurne, nocturne
- Efficacité du jeûne: peu efficace



# DIFFÉRENTS TYPES DE DIARRHÉES

- Diarrhée motrice

- Accélération du transit → ex: syndrome de l'intestin irritable

- Aspect des selles: résidus alimentaires
- Horaire des selles: matin, post prandial
- Efficacité du jeûne: efficace



# DIFFÉRENTS TYPES DE DIARRHÉES

- Diarrhée osmotique

- Présence de substances osmotiques dans la lumière digestive entrainant une sécrétion/non absorption d'eau

- Aspect des selles: liquides, mousseuses (associées à un météorisme abdominal)
- Horaire des selles: plutôt diurne
- Efficacité du jeûne: efficace



# DIFFÉRENTS TYPES DE DIARRHÉES

- Diarrhée malabsorptive

- Malabsorption due à un défaut de sécrétion enzymatique (insuffisance pancréatique) ou à un défaut d'absorption (atrophie villositaire dans la maladie cœliaque)

- Aspect des selles: bouseuses et/ou graisseuses
- Horaire des selles: plutôt diurne
- Efficacité du jeûne: efficace
- Association à dénutrition et syndrome carentiel en raison de la malabsorption

