



La santé en France

UE 1.2 S2 Santé publique et économie de la santé

LE VINATIER

PSYCHIATRIE UNIVERSITAIRE
LYON MÉTROPOLE



L'état de santé en France

- **1** La définition des priorités nationales et régionales de santé
- **2** Données démographiques et épidémiologiques
- **3** Bilan de l'état de santé en France
- **4** Les plans stratégiques

1 Les priorité nationales et régionales

1.1 les priorités nationales

Depuis 1996, objectifs fixés par le parlement

Rapport annuel du haut conseil de la santé
publique

Conférence nationale de santé

Missions de la conférence nationale de santé :

Analyser les données relatives à la situation sanitaire de la population et à l'évolution des besoins de santé

Faire des propositions sur la hiérarchisation et sur les orientations à prendre pour l'organisation des soins



Depuis 2004 : suivi annuel de 100 objectifs
Retenus suite à une consultation nationale
Classés en fonction de déterminants de santé,
de pathologies, de problèmes de santé
spécifiques à des groupes de population

Depuis 2016 : définition d'une stratégie
nationale de santé, indicateurs plus
synthétiques, évaluation pluriannuelle



- **Exemple : l'alcool**

Objectif quantifiable :

Diminuer la consommation annuelle moyenne d'alcool par habitant de 20%

Passer de 10,7 litres/an/habitant en 1998 à 8,5 litres/an/habitant en 2008

Indicateur :

Consommation annuelle d'alcool par habitant

- **Indicateurs**
- Age moyen d'initiation à l'alcool
- Prévalence des comportements d'ivresse répétés
- Proportion de femmes enceintes consommant de l'alcool pendant leur grossesse

Chiffres clés sur la consommation d'alcool en France métropolitaine (santé publique France)

23,6% des personnes de 18-75 ans dépassaient les repères de consommation en 2017

11,7 litres par an et par personne de 15 ans et plus

41 000 décès attribuables à l'alcool par an, dont 30 000 chez les hommes et 11 000 chez les femmes

16 000 décès par cancer et 9 900 décès par maladie cardiovasculaire chaque année

87% des 18-75 ans consomment de l'alcool au moins une fois par an

26% des 65-75 ans déclarent une consommation quotidienne d'alcool

13,4% des 18-24 ans déclarent au moins 10 ivresses par an

1.2 Les priorités régionales

Pilotage par les agences régionales de santé

Conférences régionales : déclinent la politique nationale en fonction des spécificités de la région (sanitaire, sociale, environnementale, culturelle, économique)

Depuis 1998, comité régional des politiques de santé

Programmes régionaux de santé depuis les années 90

Les programmes régionaux de santé publique

Diminuer l'importance des problèmes de santé prioritaires pour chaque région

Réponse à des besoins identifiés

3 PRS en Rhône-Alpes de 1998 à 2003

« prévention des suicides et des tentatives de suicide »

« alcoolisation excessive »

« sida »

Le PRS Rhône-Alpes 2011-2015

Un contexte socio-économique favorable

Indicateurs de santé meilleurs que la moyenne française :

➤ Espérance de vie (2005-2007)

H : 78,6 ans (77,5 ans en France)

F : 85,2 ans (84,3 ans en France)

➤ Taux de mortalité

H : 1116/100000 (France : 1168)

F : 629/100000 (France : 668)

Le PRS Rhône-Alpes 2011-2015

Éléments clés :

Inégalités territoriales et économiques

- Déterminants de santé défavorables dans certains territoires
- Offre de soin libérale inégalement répartie
- Mortalité évitable forte
- 5000 décès évitables par an

Rupture dans la prise en charge des patients et usagers du système de santé

Le Projet Régional de Santé Rhône-Alpes 2018 - 2028

- Prévention
- Accès aux soins de premier recours
- Insertion en milieu de vie ordinaire, accès aux droits communs
- Parcours de santé adapté à la personne âgée
- Précocité du dépistage et du diagnostic en santé mentale

Plan régional santé environnement (PRSE)

Intégré au plan régional de santé publique

Objectifs :

Garantir un air et une eau de bonne qualité

Prévenir les pathologies d'origine environnementale
et notamment les cancers

Mieux informer et prévenir les populations sensibles

Le programme régional d'accès à la prévention et aux soins (PRAPS)

Élaboré dans chaque région

A pour but de faciliter l'accès des plus démunis aux soins

Ex : CMU

Intégré au plan régional

2 Données démographiques et épidémiologiques

Bilan démographique publié par l'INSEE le 17/01/2023

□ Population :

La population de la France représente 15% des habitants de l'UE
(Allemagne = 19%)

2023 : 68,4 millions d'habitants (61,9 en 2008)

Projection 2050 : 70 millions d'habitants

Ralentissement de la croissance de la population française

Baisse de la fécondité

Nombre de naissances au plus bas depuis 1946

Augmentation de 0,8% du nombre de décès en 2022

Une personne sur 5 a plus de 65 ans



- Taux de natalité : rapport du nombre de naissances vivantes de l'année à la population moyenne de l'année

10,6 naissances/1000 ha (2022)

723 000 naissances en 2022

- Taux de fécondité :

1,68 enfant/femme (2023)

- Age des mères à la naissance

Âge moyen : 31 ans (2023)

Bulgarie : 26,5 (2019) Italie : 31,3 (2019)

En 2021, 19,2% des femmes ont plus de 35 ans (7% en 1981)

TAUX DE NATALITÉ PAR ÉTAT ET TERRITOIRE EN 2021



- 3,6% des naissances sont issues d'une AMP (2021)
- 8% d'enfants prématurés (2011), moins de 37 semaines d'aménorrhée
- 12,2% des femmes déclarent consommer du tabac au dernier trimestre de la grossesse
- Taux de césarienne : 21,4% des accouchements (2021)
- Mortalité maternelle (2015)

80 à 100 décès par an

Espérance de vie à la naissance :

Nombre d'années qu'un nouveau-né peut espérer vivre à la naissance dans une région donnée

Homme = 80 ans (2023)

Femme = 85,7 ans (2023)

Espérance de vie sans incapacité : nombre d'années qu'une personne peut espérer vivre sans être limitée dans les activités de la vie quotidienne

A la naissance (2020) : Homme = 64,4 ans

Femmes = 65,9 ans


A 65 ans (2021), sans incapacités sévères :

H = 11,3 ans

F = 12,6 ans

Comment l'espérance de vie a évolué

Espérance de vie à la naissance dans le monde et une sélection de pays de 1960 à 2020, en années



Sélection de pays du G20
Sources : Banque mondiale, ONU

LE VINATIER
PSYCHIATRIE UNIVERSITAIRE
LYON MÉTROPOLE



- **Espérance de vie à 65 ans (2020):**

La plus élevée d'Europe

Femmes : 23 ans

Hommes : 18,9 ans

- **Mortalité infantile (2022):**

Nombre de décès dans la première année de vie pour
1000 naissances vivantes

3,9 décès/1000 naissances (en hausse)

Mort inattendue du nourrisson : 250 à 350 décès par
an

3 Bilan sur l'état de santé de la population en France (DREES,2022)

Deux enjeux majeurs :

Vieillesse de la population

Développement des maladies chroniques

3.1 De fortes inégalités

- Les maladies chroniques surviennent plus fréquemment chez les personnes aux faibles revenus
- Le recours au dépistage est inégal selon le niveau de vie
- L'accès aux soins demeure inégal d'un territoire à l'autre
- Les inégalités de santé apparaissent dès avant la naissance

LES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ PERSISTENT



13 ANS

D'ÉCART D'ESPÉRANCE DE VIE

Les 5 % les plus aisés vivent 13 ans de plus que les 5 % les plus modestes (chez les hommes).

8 ans chez les femmes

2,4 %



ONT RENONCÉ À DES SOINS À CAUSE DU COÛT

1,6 fois plus de risques de renoncer à des soins en vivant sous le seuil de pauvreté monétaire.

Selon l'étude de la Drees (septembre 2022))

MALADIES CHRONIQUES

2,8 FOIS +

DE SUR-RISQUES LIÉS AU DIABÈTE



Les 10 % les plus modestes sont 2,8 fois plus touchés par le diabète que les 10 % les plus aisés.

ALIMENTATION

2 À 3 FOIS +

D'OBÉSITÉ



chez les personnes non-diplômées que chez les personnes titulaires d'un bac+3.

SANTÉ MENTALE

17 %

DES PLUS MODESTES SONT TOUCHÉS PAR UN SYNDROME DÉPRESSIF



contre 7 % pour les 20 % les ménages les plus aisés.

care news

LE VINATIER

PSYCHIATRIE UNIVERSITAIRE
LYON MÉTROPOLE



3.2 La réduction de la mortalité prématurée

Mortalité prématurée = décès avant 65 ans

H = 257/100 000 personnes

F = 127/100 000 personnes

Diminution du nombre de décès par mort violente entre 2011 et 2017 : diminution du taux de suicide, mortalité par accident deux fois plus élevée chez les hommes que chez les femmes


- Mortalité plus élevée dans le nord et le nord est de la France
- Surmortalité liée à la grippe : plus importante chez les hommes que chez les femmes
- Surmortalité liée aux épisodes de canicule plus importante chez les femmes,

La grippe en France

Les chiffres clés en métropole, du 5 au 11 décembre 2022
et variation par rapport à la semaine précédente



Incidence de la grippe en France* depuis 2017
Nombre de consultations pour syndrome grippal / 100 000 hab.



Le niveau d'alerte régional de la grippe
(5 - 11 décembre 2022)

- Épidémie
 - Pré-épidémie
 - Post-épidémie
 - Pas d'alarme
- Guadeloupe Martinique




*en métropole. Sources: Santé publique France, réseau Sentinelles.

VISACTU

Canicule : un décès sur six en excès chez les plus de 75 ans en France

Mortalité en excès en 2022 (juin-août 2022)



SOURCE : SANTÉ PUBLIQUE FRANCE

LesEchos

LE VINATIER

PSYCHIATRIE UNIVERSITAIRE
LYON MÉTROPOLE

3.3 Les maladies chroniques et le cancer

3% de la population des 45-64 ans cumule 3 pathologies



21% de la population au-delà de 75 ans cumule 3 pathologies

Depuis 2014, les cancers sont la première cause de mortalité pour l'ensemble de la population

- Les maladies cardioneurovasculaires concernent 13% des bénéficiaires de la sécurité sociale
- Les maladies psychiatriques concernent 8% des bénéficiaires de la sécurité sociale
- Une personne sur 10 présente un syndrome dépressif en 2019 (12% F, 9% H). Pour 4% de la population ce syndrome est majeur.
- Une personne/5 âgée de 75 ans ou plus déclare souffrir de douleurs physiques fortes ou très fortes.

Le Covid-19, troisième cause de mortalité

Nombre annuel de décès en France attribués aux causes sélectionnées *



* Covid-19 : décès enregistrés en 2020. Autres causes de mortalité : dernières données disponibles de 2016.
Sources : Santé publique France, Our World in Data



- Les maladies cardiovasculaires constituent la 2ème cause de décès

24,7% de décès par cardiopathie ischémique

Diminution de 40% des taux de décès entre 2000 et 2010 pour les cardiopathies ischémiques

150 000 personnes sont victimes d'AVC chaque année.

30 000 décès par an

40% des patients sont pris en charge dans une unité neurovasculaire (135 UNV en 2017)

500 000 français vivent avec des séquelles d'AVC

Les taux d'incidence ne diminuent pas.

Il existe des disparités géographiques importantes au niveau des taux de décès

Première cause de handicap moteur non traumatique

Deuxième cause de mortalité chez la femme

Deuxième cause de démence

- Depuis 2004, le cancer est la première cause de décès pour l'ensemble de la population.

Responsable de 4 décès prématurés/10

Survie relative : 50% à 5 ans

Les hommes ont généralement des cancers plus graves


Amélioration globale de la survie sauf pour le cancer du poumon

De 1980 à 2012, augmentation de l'incidence et diminution de la mortalité

Cancer du poumon : augmentation de l'incidence et de la mortalité chez la femme

Cancer du sein : diminution du taux d'incidence et de la mortalité, en 2013, le taux de participation au programme de dépistage était de 51,6%

Cancer colorectal : seconde cause de mortalité par cancer, participation de 31% au programme de dépistage




30/04/2021

3.4 Impact de l'épidémie de COVID sur l'état de santé de la population

- Sept vagues épidémiques entre février 2020 et aout 2022
- Diminution de l'espérance de vie en 2020
- Surmortalité exceptionnelle
- Diminution du nombre de séjour hospitalier hors Covid en 2020
- Augmentation des problèmes de santé mentale chez les jeunes

L'impact de la pandémie sur la santé mentale

Estimation de la prévalence de symptômes dépressifs dans la population adulte, en %



* données de 2020 pour Australie, Italie, Japon, Mexique et Suède.
Les méthodes d'enquête peuvent varier entre les pays.

Source : OCDE



3.5 Les déterminants de la santé

- Diminution de la consommation d'alcool depuis 2000 :

Augmentation des alcoolisations ponctuelles


10% de la population française adulte

consomme quotidiennement de l'alcool

6% F 15% H

40 000 décès par an

Usage quotidien d'alcool chez les 18-75 ans (%)



- Le tabac = répercussion en terme de mortalité et morbidité

Première cause de mortalité évitable

25,5% des 15 ans et plus fument quotidiennement

75 000 décès/an (2015)

13% des décès attribuables au tabagisme

Tendance à la baisse jusqu'en 2020


Usage de la cigarette électronique :

3,4% d'utilisateurs avec un vapotage quotidien

Davantage les plus diplômés

Prévalence du tabagisme quotidien selon le sexe

En %, évolution 2000-2020 (18-75 ans)



« LES ÉCHOS » / SOURCE : SANTÉ PUBLIQUE FRANCE

LE VINATIER

PSYCHIATRIE UNIVERSITAIRE
LYON MÉTROPOLE

- **Cannabis** : 39,1% des jeunes de 17 ans l'ont expérimenté (2017)

6,5% des jeunes de 17 ans en consomment régulièrement (2011)

2,1% des 18-64 ans en consomment régulièrement (2011)

1,2 millions d'usagers réguliers pour le cannabis

400 000 usagers réguliers pour la cocaïne

90 000 usagers réguliers pour l'héroïne

150 000 personnes ont bénéficié d'un remboursement de médicaments de substitution (2012)

13% de décès liés aux opioïdes licites (2017)

Cocaïne : 9% des décès en 2013 – 26% en 2017

Héroïne : 15% des décès en 2012 – 30% en 2015

Depuis 2011, des décès impliquent le cannabis (toxicité cardiovasculaire)

- **Alimentation**

75% des personnes de plus de 75 ans consomment une portion de fruits ou légumes par jour

8,5% des personnes consomment des fruits moins d'une fois/semaine ou jamais

9,6% des personnes consomment des boissons sucrées tous les jours

- **Activité physique**

L'inactivité physique a été évaluée en 2012 comme la 4^{ème} cause de mortalité évitable dans le monde

31% personnes pratique quotidiennement 30 minutes de marche ou de vélo

- **Surpoids-obésité** : disparités socioéconomiques importantes

Depuis 1997, la prévalence du surpoids chez l'adulte est de 30% En 2020 la prévalence de l'obésité chez l'adulte est de 17%

La prévalence du surpoids est plus importante chez les hommes mais c'est le contraire pour l'obésité (2020)

- **Augmentation de la prévalence du diabète** :


3,3 millions de personnes traitées en 2012

5,3% en 2020, soit plus de 3,5 millions de personnes traitées pour un diabète .


90% des cas = diabète de type 2

En France métropolitaine, la prévalence du diabète gestationnel a tendance à augmenter. Elle était de 8% en 2012 contre 3,8% en 2004. Dans la majorité des cas, le diabète gestationnel disparaît après la grossesse mais il peut aussi installer un diabète de type 2 quelques années plus tard.

Augmentation du nombre de personnes traitées pour insuffisance rénale terminale.



Prévalence de



- Morbidité liée aux accidents du travail importante dans certains secteurs d'activité :

En 2010 : 2,2 millions de salariés sont exposés à des produits chimiques classés cancérogènes

Le CIRC classe le travail de nuit posté dans la liste des agents potentiellement cancérogènes.

En 2005 : **34% des salariés** déclaraient devoir rester longtemps dans une posture pénible ou fatigante

En 2010 8,3% des salariés sont soumis à des gestes répétitifs au moins 20h par semaine.

10% des salariés sont soumis à une manutention manuelle des charges.

En 2019 : 33,5 accidents /1000 salariés

Les troubles musculosquelettiques sont la première cause de maladie professionnelle

4 Les plans stratégiques

- Les plans de santé publique mettent en exergue les problématiques propres à une **pathologie, une population** ou un **mode de prise en charge** afin de structurer et de renforcer les réponses qui doivent y être apportées.

- Les plans stratégiques sont élaborés et mis en œuvre conjointement par plusieurs directions du ministère chargé de la santé.
- Ces plans de santé publique ont pour la plupart un caractère pluriannuel.

- Les plans de santé publique apportent des leviers d'amélioration reposant parfois sur la création de dispositifs nouveaux mais surtout sur des **changements de pratiques professionnelles et organisationnelles** en agissant notamment sur la formation initiale des professionnels paramédicaux.

Ainsi, les plans de santé publique doivent notamment permettre aux professionnels de santé de s'adapter aux nouveaux enjeux :

- apparition de nouvelles pathologies,
- évolution épidémiologique (cancers, VIH, tuberculose...),
- changements démographiques de notre société (vieillissement de la population française)
- transfert de technologies.

Stratégie décennale de lutte contre le cancer 2021 - 2030

- 40% des cancers sont évitables
- 2 personnes sur 3 souffrent de séquelles liées à la maladie ou au traitement
- **4 axes :**

Améliorer la prévention

Limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie

Lutter contre les cancers de mauvais pronostic

S'assurer que les progrès bénéficient à tous

Plan d'action national : AVC 2010-2014

Plan d'action AVC pour l'Europe 2018-2030

- 400 000 personnes concernées
- En 2010, 20% des patients étaient hospitalisés en unité neurovasculaire
- 135 UNV
- 1% des patients bénéficient d'une thrombolyse
- Améliorer la prévention et l'information de la population
- Mettre en place des filières de prise en charge

Stratégie nationale maladies neurodégénératives 2024- 2028

- Maladie d'Alzheimer : 850 000 personnes
 - Maladie de Parkinson : 150 000 personnes
- 20% des patients touchés par la maladie avant 65 ans
- SEP : 85 000 personnes
 - 40% des résidents en EHPAD présentent une maladie neurodégénérative
 - D'ici 2050, doublement de la population en perte d'autonomie

- 3 axes prioritaires ;

Améliorer le diagnostic et la prise en charge des malades

Assurer la qualité de vie des malades et de leurs aidants

- 74 équipes spécialisées Alzheimer
- Solutions numériques pour améliorer l'autonomie

Développer et coordonner la recherche



Plan psychiatrie et santé mentale 2018 - 2023

- L'OMS estime qu'une personne sur 5 vivra au cours de sa vie un trouble psychique.
- 5 des 10 pathologies les plus préoccupantes au 21ème siècle concernent la psychiatrie : schizophrénie, troubles bipolaires, addictions, dépression, troubles obsessionnels compulsifs
- Prévenir et réduire les ruptures au cours de la vie de la personne
- Trois axes : droit et sécurité en psychiatrie, troubles mentaux sévères et persistants et handicap psychique, pédopsychiatrie

Stratégie nationale de santé sexuelle 2017 - 2030

- En France, 173 000 personnes vivaient avec le VIH (2021)
- 5000 découvertes de séropositivité chaque année
- Le recours à l'IVG reste stable : 200 000/an
- 2/3 femmes ayant recours à l'IVG utilisaient un moyen de contraception
- Faible taux de vaccination contre le papillomavirus
- Importance du dépistage des IST

Stratégie nationale de lutte contre les violences faites aux femmes

- Aucune violence déclarée ne doit rester sans réponse
- 244 000 personnes victimes de violence conjugale en 2022 dont 85% de femmes
- Nécessité de protéger les victimes
- Mobiliser l'ensemble de la société
- 39 19 : 50 000 appels/an
- Site : [arrêtons les violences,org](http://arrêtons-les-violences.org)
- 327 lieux d'écoute et de proximité
- 1550 places d'hébergement créées

PNNS 2019- 2023



- Réduire l'obésité et le surpoids de la population
- Augmenter l'activité physique et diminuer la sédentarité à tous les âges (prescription d'APA)
- Améliorer les pratiques alimentaires et les apports nutritionnels notamment chez la population à risque
- Réduire la prévalence des pathologies nutritionnelles

LE PLAN SANTE AU TRAVAIL (2021 – 2025)

En 2014 : 620 000 accidents du travail

530 accidents mortels

51 000 maladies professionnelles reconnues

Lutte contre les facteurs psychosociaux (stress)

Risques liés aux nouvelles technologies

Risque routier majeur



➤ Deux axes stratégiques principaux :

Donner la priorité à la prévention primaire et développer la culture de la prévention

Améliorer la qualité de vie au travail, levier de santé, de maintien en emploi des travailleurs et de performance économique et sociale de l'entreprise

Stratégie nationale 2022 – 2025 de prévention des infections et de l'antibiorésistance

- Prévenir les infections courantes (bronchites, gastro-entérites) grâce à des gestes quotidiens et à la vaccination
- Réduire le risque d'infections associées aux soins, notamment les infections nosocomiales
- Préserver l'efficacité des antibiotiques
- Les IAS concernent 5% des patients hospitalisés un jour donné
- 15% des décès hospitaliers sont attribuables à une IAS

Stratégie interministérielle de mobilisation contre les conduites addictives 2023 - 2027

- Protéger dès le plus jeune âge : développer les compétences psychosociales permettant d'éviter des comportements à risque
- Mieux répondre aux conséquences des addictions pour les citoyens et la société
- Prendre en compte l'impact environnemental
- Améliorer l'efficacité de la lutte contre le trafic
- Renforcer les connaissances et améliorer leur diffusion
- Renforcer la coopération internationale, créer les conditions de l'efficacité de l'action publique sur l'ensemble du territoire

Classification Actualisée des compétences psychosociales

Catégories	CPS générales	CPS spécifiques
Compétences cognitives	Avoir conscience de soi	Connaissance de soi (forces et limites, buts, valeurs, discours interne...)
		Savoir penser de façon critique (biais, influences...)
		Capacité d'auto-évaluation positive
		Capacité d'attention à soi (ou pleine conscience)
	Capacité de maîtrise de soi	Capacité à gérer ses impulsions
		Capacité à atteindre ses buts (définition, planification...)
	Prendre des décisions constructives	Capacité à faire des choix responsables
Capacité à résoudre des problèmes de façon créative		
Compétences émotionnelles	Avoir conscience de ses émotions et de son stress	Comprendre les émotions et le stress
		Identifier ses émotions et son stress
	Réguler ses émotions	Exprimer ses émotions de façon positive
		Gérer ses émotions (notamment les émotions difficiles : colère, anxiété, tristesse...)
	Gérer son stress	Réguler son stress au quotidien
		Capacité à faire face (coping) en situation d'adversité
Compétences sociales	Communiquer de façon constructive	Capacité d'écoute empathique
		Communication efficace (valorisation, formulations claires...)
	Développer des relations constructives	Développer des liens sociaux (aller vers l'autre, entrer en relation, nouer des amitiés...)
		Développer des attitudes et comportements prosociaux (acceptation, collaboration, coopération, entraide...)
		Savoir demander de l'aide
	Résoudre des difficultés	Capacité d'assertivité et de refus
		Résoudre des conflits de façon constructive

Stratégie « bien vieillir » novembre 2023

- Lutter contre la perte d'autonomie
- Favoriser une approche positive du vieillissement



Les défis du vieillissement et la prévention de la perte d'autonomie

Personnes âgées

En 2030

1 Français sur 3
aura plus 60 ans



Pour la première fois, les + de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans

(DREES/INSEE)

En 2050 : 2 millions de personnes bénéficieront de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) contre 1,4 million en 2023

(source DREES)

L'espérance de vie en bonne santé des personnes de plus de 65 ans a progressé de 2 ans et 8 mois pour les hommes et 2 ans et 7 mois pour les femmes

(source DREES)



92 %

des Français souhaitent vieillir chez eux

Source : enquête Harris Interactive, novembre 2022

532 000

personnes de plus de 60 ans ne voient jamais ni leurs amis, ni leur famille

Source DREES



6

PRÉPARER LA FRANCE DE DEMAIN, AJOUTER DE LA VIE AUX ANNÉES – Stratégie « Bien Vieillir »
Dossier de presse – Novembre 2023

LE VINATIER

PSYCHIATRIE UNIVERSITAIRE
LYON MÉTROPOLE



Bibliographie

- L'état de santé de la population en France - Indicateurs associés à la loi relative à la politique de santé publique Rapport 2007, HCSP
- La santé en France et en Europe : convergences et contrastes, Rapport mars 2012, HCSP, ministère de la santé
- Rapport 2016 de l'OCDE (organisation de coopération et de développement économique)
- L'état de santé de la population en France, édition 2015, DREES
- L'état de santé de la population en France, édition 2022, DREES
- Bilan démographique 2023, INSEE