La REANIMATION

Pour les ~~nuls~~ débutants

IFSI Vinatier
Février 2025
A BUFFIN

Sommaire

- Les différents monitorages en réanimation et les abords vasculaires centraux
 - . L'intubation
 - La ventilation mécanique
 - Les soins infirmiers aux patients intubés ventilés
 - . La surveillance de la fonction respiratoire.
 - Le DV

Les différents monitorages en réanimation

Ou comment surveiller son patient

Le monitoring ECG

- Le rythme est dit sinusal lorsque l'activité du cœur est issue du nœud sinusal
- Toute activité électrique née en dehors de cette chronologie précède aboutira à un trouble du rythme
- Toute lésion importante interrompant ce circuit aboutira à un trouble plus ou moins grave de la conduction auriculo-ventriculaire

Rappel électro-physiologique

- L'électrocardiogramme (ECG) est l'enregistrement et la **représentation visuelle de l'activité électrique** globale du cœur, au moyen d'un électrocardiographe.
- Les cellules cardiaques = piles électriques
- Alternance de mouvements de décharge (**dépolarisation**) et de recharge (**repolarisation**) sous l'influence de mouvements ioniques
- Tourniquet cellulaire :
entrée de sodium // sortie de potassium et de calcium

- équilibre hydrique
- contraction musculaire
- maintien de la TA
- transmission de l'influx nerveux

- Le tissu nodal = cellules spécialisées dotées d'une activité autonome indépendante des centres nerveux
- Départ de l'influx nerveux au niveau du **noeud sinusal**(oreillette droite)
- Il gagne le **noeudde Tawara (auriculo-ventriculaire)**emprunte le **faisceau de His** «**autoroute à grande vitesse**» au niveau de la cloison interventriculaire
- Déclenchement de la contraction quasi simultanée des 2 ventricules(**réseau de Purkinje**)

- 1 contraction des oreillettes
- 2 contraction des ventricules
- 3 repolarisation des ventricules

ECG tracé de base

Onde P = dépolarisation des oreillettes

Complexe QRS = dépolarisation des ventricules

Onde T = repolarisation ventriculaire

Espace PR = temps que met l'influx électrique

pour aller des oreillettes aux ventricules

Segment ST = temps qui sépare la fin de la dépolarisation
du début de la repolarisation ventriculaire

Onde P précèdent

chaque complexe QRS

La dépolarisation d'une cellule désigne le
passage transitoire du potentiel de membrane
d'une valeur négative dite de repos vers une
valeur positive

Rythme sinusal normal :

- . Fréquence : 60 à 90 bpm
- . Rythme sinusal
- . Complexe complet
- . Intervalles normaux

TROUBLES DU RYTHME VENTRICULAIRES

- **FIBRILLATION VENTRICULAIRE:** équivalent d'un **arrêt circulatoire**
- Tracé désorganisé à complexes QRS élargis, fréquence cardiaque impossible à déterminer
- CEE immédiat et RCP

TROUBLES DU RYTHME VENTRICULAIRES

TORSADE DE POINTE: Fréquence entre 200 et 250 environ, amplitude variable, polarité variable: les complexes QRS pointent alternativement vers le haut et vers le bas. *Impression que le tracé tourne autour de la ligne isoélectrique de base*

RISQUE = dégénérescence en FV. TTT par CEE. Surtout prévenir la récurrence:

TROUBLES DU RYTHME VENTRICULAIRES

LA TACHYCARDIE VENTRICULAIRE : Les éléments importants pour la prise en charge sont le terrain, la tolérance, la durée et l'aspect ECG. + de 3salves = TV soutenue.

TROUBLES DU RYTHME AURICULAIRES

UN **BLOC ATRIO-VENTRICULAIRE (BAV)** :C'est un défaut de transmission de l'influx électrique (ralentissement ou interruption) entre les [oreillettes](#) et les [ventricules](#) du cœur.

BAV du troisième degré: dissociation auriculo-ventriculaire complète avec rythme ventriculaire lent

TTT : en cas de syncope ou de bas débit.

- **ISUPREL**:
- **ATROPINE**: 0.5-1mg IVD
- **Pace maker**

BAV 1 : pas de ttt

TROUBLES DU RYTHME AURICULAIRE

FIBRILLATION AURICULAIRE : Rythme irrégulier, pas d'ondes P individualisées avec tremblement de la ligne iso-électrique

Ttt: anticoagulation (risque embolique++), réduction/ CEE ou CORDARONE

Concrètement : le branchement

Le cathétérisme artériel

DEFINITION

Un cathéter artériel est un [cathéter](#) introduit dans une [artère](#) périphérique permettant la mesure de la [pression artérielle](#) sanguine en continu, ou permettant les prélèvements sanguins artériels fréquents notamment des gaz du sang.

CADRE LEGISLATIF

Pose relevant d'un acte médical, rôle infirmier de collaboration : art. R.4311-10 décret 2004-802 du 29/07/2004.

Prélèvements sanguins relevant du rôle sur prescription médicale : art. R.4311-7 décret 2004-802 du 29/07/2004.

Surveillance relevant du rôle propre infirmier : art. R. 4311-5 décret 2004-802 du 29/07/2004.

pose = médicale surveillance

PRINCIPE ET FONCTIONNEMENT

Le cathéter artériel est inséré dans une artère périphérique. Une tête de pression est reliée à ce cathéter à l'aide d'une tubulure. Elle permet de transformer en influx électrique les variations de pressions lors des contractions cardiaques et ainsi de créer une courbe sur le moniteur.

Les pressions sont mesurées par rapport à la pression atmosphérique. Il est donc nécessaire de faire une mise à zéro de la tête de pression à la pression atmosphérique. Le zéro de référence doit être représenté par l'oreillette droite.

La courbe de pression artérielle :

Pression artérielle :

- Systolique
- Diastolique
- Moyenne

La pression moyenne :
 $= (2(\text{PAD}) + \text{PAS})/3$

A photograph of a chalkboard with a stethoscope resting on it. The chalkboard contains the following handwritten text:

$$\begin{array}{l} dp \ 87 \\ \hline sp \ 120 \\ MAP = \frac{(2(87) + 120)}{3} \\ \hline = \frac{(294)}{3} = 98 \text{ mm Hg} \end{array}$$

The background of the chalkboard is dark brown, and the chalk is white. A black stethoscope is visible behind the text.

- vérifie s'il y a suffisamment de flux sanguin, de résistance et de pression pour fournir du sang à tous vos principaux organes
- cible à atteindre pour de nombreuses thérapeutiques (ex : les amines)

La saturation

- permet de mesurer de façon simple, rapide, fiable, **non invasive** et continue la saturation de l'hémoglobine dans le sang artériel.
- génération de deux types de lumière, rouge et infrarouge, émises respectivement par des diodes à des longueurs d'onde de 660 et 940 nm, ainsi que sur la mesure de leur absorption par le flux pulsatile. La quantité de lumière rouge et infrarouge absorbée varie en fonction de la présence d'hémoglobine réduite (Hb) non oxygénée et d'oxyhémoglobine (HbO₂).
- Le résultat obtenu présente une corrélation étroite avec la saturation artérielle (SaO₂) mesurée par la gazométrie artérielle après prise de sang

La saturation

La capnie

- La capnométrie correspond à la mesure de la concentration de CO_2 dans les gaz respiratoires. Il s'agit d'un monitoring non invasif par branchement sur le circuit de ventilation (généralement par ligne de prélèvement branchée au niveau du filtre patient).
- On appelle capnogramme la courbe du CO_2 .
- **Valeurs de référence**
- $\text{FetCO}_2 = 5$ à $5,5\%$
- $\text{PetCO}_2 = 35$ à 40 mmHg
- $\text{PaCO}_2 = 38$ à 42 mmHg

Sonde d'Intubation (SOT)

Raccord annelé

Capnométrie

Surveillance vitale !

- Ligne plate / 0 = plus de capno
- Plus de Capno = plus de tube
- Plus de tube / ou plus de masque VNI = COURS!!!!!!

L'index Bispectral (dit « le BIS »)

- L'index BIS est le résultat de l'analyse avancée du signal EEG. Il permet de mesurer de l'effet de certains anesthésiques
- L'index BIS représente un nombre sans dimension, échelonné sur la base de critères cliniques et de fonctions EEG spécifiques. A l'état d'éveil, un individu non sédaté présente en général une valeur BIS >97
- A mesure que la sédation médicamenteuse augmente, la valeur BIS diminue

Figure 2 : L'index BIS est échelonné pour correspondre à d'importants critères d'évaluation clinique au cours de l'administration d'agents anesthésiques.

Surveillance sur scope

Une surveillance en continue

Un scope

Le report de scope

L'importance des alarmes

- Une alarme mal réglée = un patient mal surveillé
- Une alarme dans 1 chambre = une alarme dans toutes les chambres
- A chaque prise de poste jour / nuit : vérification OBLIGATOIRE des limites d'alarme en fonction :
 - Des objectifs attendus : perfusion rénale : PAM 65
 - De la pathologie du patient : BPCO / TC / Chirurgies
 - Du devenir du patient : stress des proches

Les différentes voies d'abord en réanimation

La Voie Veineuse Centrale

- Gros abord
- 3 sites :
 - jugulaire / sous clavière
 - Voie d'urgence : fémorale
- Indications :
 - Injection de produits veino-toxiques (chimiothérapie, antibiothérapie...)
 - Pauvreté du capital veineux périphérique
 - Nutrition parentérale
 - Permet de passer des traitements seuls et ainsi d'éviter les interactions médicamenteuses : exemple la voie proximale utilisée pour passer les amines (Noradrénaline, Adrénaline , Dobutamine...), la voie médiane pour les sédations (Hypnovel , Sufentanyl) et la voie distale (hydratation , antibiotiques...)
 - Mesure de la pression veineuse centrale
 - Permet la réalisation de prélèvements sanguins

3 lumières : distale / Médiane / Proximale = à chacune sa fonction

CONTRE INDICATION

- si présence d'une infection proche du site de ponction
- si présence d'un pneumothorax du coté opposé car risque d'un PNO bilatéral
- si présence d'un stimulateur cardiaque

RISQUES ET COMPLICATIONS

- [L' embolie gazeuse](#)
- les [thromboses](#) et obstruction sur cathéter
- l'infection
- le risque de [pneumothorax](#)
- Ponction artérielle (carotide)
- Hématome

SURVEILLANCE ET ACTIONS INFIRMIERS

° surveillance locale :

- du point de ponction : rougeur , écoulement tous les jours et lors de la réfection du pansement (4 ou 7 jours selon pst + à J1 de la pose)

° surveillance générale :

- température, frissons si risque d'infection,
- l'état neurologique et paramètres vitaux si risque d'embolie gazeuse,
- **Manipuler les robinets avec des compresses imbibées** d'antiseptique,

° surveillance matériel :

- intégrité du cathéter, des prolongateurs
- Changement des tubulures / 24h ou /12h si présence de lipides
- Changement de la rampe et prolongateurs / 4 jours

LE CADRE LEGISLATIF :

- Pose relevant d'un acte médical, rôle infirmier de collaboration : art. R.4311-10 décret 2004-802 du 29/07/2004.
- Prélèvements sanguins relevant du rôle sur prescription médicale : art. R.4311-7 décret 2004-802 du 29/07/2004.
- Surveillance relevant du rôle propre infirmier : art. R. 4311-5 décret 2004-802 du 29/07/2004, ce qui inclue le retrait et la surveillance liée à cet acte.

Le cathéter de dialyse

- Quand il faut se substituer à la fonction rénale
- Abord central de gros calibre (pour le pas casser les Globules)
- Abord provisoire de dialyse
- 3 localisations : Jugulaire / sous Clavière / fémorale
- Même critères de surveillance que VVC
- Toujours purger avant utilisation : présence de verrous citratés.
- Toujours refaire un verrou apres utilisation.
- Prend en charge une CEC !! SURVEILLANCE de la fixation des lignes!!!

Le picc line

- Peripheral Inserted Central Catheter
- cathéter central de moyenne durée (< 3mois) inséré au-dessus du coude par une veine périphérique du bras.
- des cathéters en simple et double lumière
- équipés de 2 ailettes à leur base permettant leur fixation sans suture ni sparadrap dans un stabilisateur adhésif
- La pose s'effectue au Bloc (sous rayons) opératoire sous anesthésie locale
- carte de pose de PICC Line dans le dossier du patient : identité du patient et de l'opérateur, la référence du cathéter et sa longueur d'implantation.
- Prélèvements sanguins possible
- RINCAGE PULSE

Picc line suite

COMPLICATIONS

Obstruction du cathéter : impossibilité d'injecter dans le cathéter modifier la position du patient en lui tournant la tête du côté opposé au Piccline, bras le long du corps, pour essayer d'obtenir un reflux (occlusion positionnelle)

Effectuer une rinçure de sérum physiologique avec une seringue luer lock de 2 ou 5 ml, « sans forcer »

Si occlusion confirmée, protocole **Urokinase**®, sur prescription médicale- Si échec prévenir le médecin prescripteur pour désobstruction en radiologie et contrôle radiologique.

Infection : rougeur au point de ponction, écoulement purulent, douleur, fièvre

Arrêter la perfusion, réaliser 2 hémocultures et demander un avis médical (retrait du cathéter ? antibiothérapie ?)

+/- envoi de l'extrémité du cathéter en bactériologie

Suspicion de fracture du cathéter

Suspicion de phlébite : augmentation de volume du membre supérieur, rougeur, douleur

- Arrêter la perfusion
- Prévenir le médecin prescripteur pour prévoir écho-doppler (retrait sur indication médicale si thrombose confirmée)

Picc line suite

RETRAIT DU DISPOSITIF

- D Dorsal
- Rôle IDE
- Vérifier la longueur du cathéter

INFORMATION, CONSIGNES A DONNER AU PATIENT

- Porter des manches amples
- Eviter les charges lourdes au niveau du bras, les sports agressifs pour le bras (tennis, golf...)
- Eviter de mouiller le pansement
- Pour la douche, protéger le pansement avec du film alimentaire
- Pas de baignade en piscine ou en mer.
- Prévenir de gêne à la mobilité, de risque de retrait inopiné
- Garder sa carte Picc-line, où sont notés les dates et lieu de pose, ainsi que la longueur du cathéter inséré

Le cathéter artériel

- Mise en place médicale mais parfois protocoles de délégation pour les IDE

Pose relevant d'un acte médical, rôle infirmier de collaboration : art. R.4311-10 décret 2004-802 du 29/07/2004.

Prélèvements sanguins relevant du rôle sur prescription médicale : art. R.4311-7 décret 2004-802 du 29/07/2004.

Surveillance relevant du rôle propre infirmier : art. R. 4311-5 décret 2004-802 du 29/07/2004.

- Voie d'abord ou surveillance invasive?
- Prélèvements possibles
- JAMAIS D'INJECTION

COMPLICATIONS :

- Infection
- Embolie gazeuse
- Migration du cathéter : cathéter incomplet à l'ablation.
- Hématome au point de ponction
- Risque hémorragique : par ablation involontaire du cathéter ou déconnexion de tubulures
- Thrombose de l'artère

Le PiCCO

Pulse Contour Cardiac Output

- permet de donner un monitoring continu du débit cardiaque par 2 méthodes de mesure : la thermodilution transpulmonaire et l'analyse du contour de l'onde puls.
- permet d'évaluer les volumes liquidiens cardiaques et pulmonaires (évaluation volumétrique de la précharge cardiaque (VTDG), appréciation de la fonction ventriculaire
- Débit cardiaque artériel (Dc) : C'est le volume de sang éjecté à chaque battement (VES) par les ventricules multiplié par la fréquence cardiaque par minute. (Normale 5 à 6 L/min).
- Index cardiaque : C'est le débit cardiaque rapporté à la surface corporelle du sujet. (normale 3 à 5L/min/m²).
- Résistances vasculaires : Le débit cardiaque est contrecarré par une résistance à l'écoulement du sang, proportionnelle à la longueur des vaisseaux et inversement à leur rayon (tonus vasomoteur) et à la surface totale des vaisseaux.

Le PiCCO :

La thermodilution :

méthode classique de mesure en discontinu par **injection de bolus froid** (NaCl 0,9%), en voie veineuse centrale

L'étude de la variation de température induite par ce bolus, mesurée en aval par la thermistance du système artériel, permet de déterminer le débit cardiaque et calculer les volumes traversés.

Pour une surveillance armée sous PiCCO, il faut :

- abord veineux central pour l'injection des bolus froids
- un KT artériel fémoral ou axillaire équipé d'une thermistance pour le recueil de la courbe de thermodilution
- une tête de pression spécifique permettant le recueil continu de la courbe de pression artérielle systémique et l'analyse du contour de l'onde de pouls.

Le Picco Pourquoi faire ?

Répondre à cette question fondamentale :

“volume ou catécholamine” ?

Le cathéter Intra OSSEUX

La voie d'urgence absolue

- accès vasculaire périphérique d'urgence, utilisé dans le contexte d'une menace vitale immédiate
- prélèvement de moelle, pour réaliser des examens sanguins d'urgence, peut être aussi réalisé avant la première injection dans le cathéter
- L'utilisation de ce type de dispositif passe par une formation théorique et pratique de courte durée. Médecins, infirmier(e).

Le KT IO :

Le avantages

- Courbe d'apprentissage rapide.
- Pose dans un délai court d'une voie d'accès sûre et efficace.
- Perfusion de tous types de solutés et médicaments.
- Possibilité de réaliser des prélèvements sanguins.
- Pharmacocinétique comparable à une VVC.
- Peu de complications.

Le KT IO :

Les contre indications

Absolues :

- Fracture osseuse du site de ponction.
- Lésion vasculaire sus-jacente.
- Réalisation d'une 2nde ponction sur un os (<48h).
 - « Brûlure » ou infection cutanée en regard du site de ponction.
- Prothèse orthopédique de genou et d'épaule.

Contre-indications relatives :

- Ostéogénèse imparfaite.
- Ostéoporose.
- Inexpérience théorique et pratique de l'opérateur.-

KT IO :

Pose et surveillance

- La **ponction** se fait sur le tibia juste au-dessus de la malléole interne, insertion sagittale, 1 à 2 cm au-dessus du condyle externe
- réaliser un flush de NaCl 0,9% permettant de créer un espace dans la cavité médullaire, et aussi de vérifier qu'aucune infiltration sous-cutanée ne soit visible : 10ml chez l'adulte, grâce à une seringue luer-lock. Ce flush est douloureux.

- Vérification de la bonne mise en place : 4 critères essentiels !!!

Immobilité de l'aiguille.

Présence d'un retour de sang ou de moelle osseuse au test d'aspiration.

Injection sans résistance.

Absence d'extravasation au moment de l'injection.

- L'administration de volumes de remplissage rapide doit être réalisée à la seringue, au PSE, à la pompe volumétrique ou à la poche à pression.

KT IO :

Surveillance

Complications : <1%

Infectieuses :

- Ostéomyélite bactérienne ou fongique.
- Infection cutanée en regard du site de ponction.
- Septicémie

Mécaniques :

- Fracture de l'os ponctionné
- Traversée complète du fût osseux.
- Syndrome des loges en cas d'extravasation.

Autres :

- Embolies graisseuses et gazeuses.
- Ostéomyélite chimique suite à l'utilisation de produits hyperalcalins et/ou hypertoniques.

Surveillance

- Coloration du membre.
- Pouls distal du membre.
- Apparition d'un œdème sous-cutané ou de la musculature.
- Position de l'aiguille (doit tenir seule).
- Perméabilité de la voie.
- Site de ponction.

Retrait :

- Max 24h
- Dans des conditions d'asepsie rigoureuse.
- Dévisser » le cathéter dans le sens des aiguilles d'une montre.
- L'aiguille doit rester perpendiculaire à l'os (90°), pas de mouvements
- d'inclinaison.

EZ-IO by **vidacare**
Intraosseous Infusion System

Immediate Vascular Access... When You Need It.™

Intraosseous Infusion System

1. Site selection and skin preparation.
2. Drilling the bone.
3. Needle insertion: **NO** (shallow) vs **YES** (5mm mark visible).
4. Attaching the EZ-IO device.
5. Connecting the tubing to the IV bag.
6. Initiating the infusion.
7. Final setup and monitoring.

Clinical Support 1-800-680-4911

Vidacare.com

La surveillance Infirmiere

Le rôle infirmier en soins critiques

- La tête et les jambes
- Une surveillance continue
- Un tour / 2 ou 4 h
- 2 à 3 patients en réa, 4 patients en USIC 5 patients en USIP.
- De jour comme de nuit
- Une grande responsabilité
- Un œil clinique à l'affut
- L'importance du binôme ASDE –IDE
- L'anticipation
- Le patient au centre de vos PEC, même s'il n'ouvre pas les yeux
- Le patient, les machines L'entourage!!!!

Et concrètement

Un tour de chambre

- Les 3 a :
 - Ambu (BAVU)
 - Alarmes scope + alimentation électrique respi et scope
 - Aspiration
- La vérification d'identité : concordance bracelet patient / étiquette / identité informatique
- Vérification du matériel présent et fonctionnel en chambre

Date + chambre
Matériel de monitoring
Thermomètre
Câbles ECG + 12D
Brassard à TA + câble
Pince SpO2 + câble
Mât scope
Manomètre O2
Manomètre Air
Manomètre vide - 600
Humidificateur (non monté)
Aspiration fonctionnelle
BAVU fonctionnel
Stéthoscope
Plein réalisé
Télécommande TV
Chariot IDE
Plein réalisé
Lecteur glycémie
Dossier d'admission présent
Bracelet O et B
Absence d'étiquettes PATIENT dans la pochette
Respirateur
Respi remonté et vérifié
Mât nursing
Plein réalisé
Matériel divers
Cantine
Chemise patient
Lit taré
Signature ASD
Signature IDE

Surveillance clinique

Constantes :

- TAS / TAD / TAM
- Température
- Pouls
- Diurèse
- Glasgow / BIS
- B.P.S / RASS
- Pupilles
- Poids / jour!
- Glycémie
- Curarimétrie

Contentions

Waterloo / semaine

Soins de nursing :

chez le patient intubé :

- SPE /4h avec aspi susglotique
 - SDB /4h
- => obj : prévention des PAVM.

Score de Glasgow

Score	Y = Ouverture des yeux	V = Réponse verbale	M = Réponse motrice
1	Aucune	Aucune	Aucune
2	À la douleur	Incompréhensible	Extension réflexe
3	Au bruit	Inappropriée	Flexion réflexe
4	Spontanée	Confuse	Orientée à la douleur
5		Orientée	Adaptée à la douleur
6			Obéit à un ordre oral

L'échelle BPS (Behavioral Pain Scale)

Critère	Score	Description	Interprétation
Expression du visage	1	Détendu	Absence de douleur
	2	Plissement du front	Douleur légère
	3	Fermeture des yeux	Douleur modérée
	4	Grimace	Douleur intense
Tonus des membres supérieurs	1	Aucun	Absence de douleur
	2	Flexion partielle	Douleur légère
	3	Flexion complète	Douleur modérée
	4	Rétraction	Douleur intense
Adaptation au respirateur	1	Adapté	Absence de douleur
	2	Détachement ponctuel	Douleur légère à modérée
	3	Lutte contre le respirateur	Douleur modérée à intense
	4	Non ventilable	Douleur intense
Score total	3 à 12	Interprétation	
	3 à 4	Douleur absente ou légère	
	5 à 7	Douleur modérée	
	8 à 12	Douleur intense

Richmond Agitation Sedation Scale (RASS)

Scale	Label	Description	
+4	Combative	Violent, immediate danger to staff	OBSERVATION
+3	Very agitated	Pulls or removes tube(s) or catheter(s); aggressive	
+2	Agitated	Frequent non-purposeful movement, fights ventilator	
+1	Restless	Anxious but movements not aggressive, vigorous	
0	Alert and calm	Spontaneously pays attention to care giver	
-1	Drowsy	Not fully alert, but has sustained awakening (eye-opening/eye contact) to voice (>10 seconds)	VOICE
-2	Light sedation	Briefly awakens with eye contact to voice (<10 seconds)	
-3	Moderate sedation	Movement or eye opening to voice (but no eye contact)	
-4	Deep sedation	No response to voice, but movement or eye opening to physical stimulation	TOUCH
-5	Unarousable	No response to voice or physical stimulation	

Score de Waterlow

Valider Fermer

09/01/2025 à 15:41 = maintenant

Braden Norton Waterlow

Sexe : F Age : 101

Masse corporelle

Moyenne Au-dessus de la moyenne
 Obèse En-dessous de la moyenne

Incontinence

Totale / Sonde Occasionnellement
 Incontinence fécale, sonde Incontinence double

Appétit

Moyen Faible A jeun, anorexique
 Alimentation par sonde gastrique uniquement gastrique

Déficience neurologique

Diabète, Sclérose en plaque, AVC, Déficit sensoriel, paraplégies

Médicament

Cytotoxiques, Corticoïdes à haute dose, Anti-inflammatoire

Aspect visuel de la peau

Saine Fine / Grêle
 Sèche / Déshydratée Oedémeuse
 Décolorée Irritation cutanée

Mobilité

Complète Agité
 Apathique Restreinte
 Immobile / Traction Patient mis au fauteuil

Malnutrition des tissus

Cachexie terminale Déficience cardiaque
 Insuffisance vasculaire périphérique Anémie
 Tabagisme

Chirurgie / Traumatisme

Orthopédie, Partie inférieure, Colonne
 Intervention de plus de 2 heures

Total : 7

Pupille droite		Pupille gauche	
Diamètre	Réactivité à la lumière	Diamètre	Réactivité à la lumière
Myosis serré (1)	Aréactives (-)	Myosis serré (1)	Aréactives (-)
Myosis (2)	Faiblement réactives (+/-)	Myosis (2)	Faiblement réactives (+/-)
Intermédiaire (3)	Réactives (+)	Intermédiaire (3)	Réactives (+)
Semi-mydriase (4)		Semi-mydriase (4)
Mydriase complète (5)		Mydriase complète (5)	

Dossier d'Admission Observation médicale
 Bilan E/S Transmission
 Impressions Autres Ecrans...

Lit : 1.65
 NIP : 675266 Sexe : M Age : 61 ans
 Poids entré : 82 kg Poids : 82,5 kg (6 J) le : 04/01/2025
 Conclusion Admission : Taille : ?
 Allergies : Aucune allergie renseignée
 Poids idéal théorique : ? IMC : ?
 JOP : - 114

IDE LA COSTE DE FONTENILLES I. ASD BESSAA C. IDE THOMAS A. Jeudi 09 (Aujourd'hui) ASD : 7-19h
 IGSII : ? 7h 18h 19h

Contexte : 1. Réanimation
 Date d'affichage : 09/01/2025
 Jeudi (Aujourd'hui)

Prise de poste ASD 12h
 Repère sonde d'intubation 12h

Semaine Aujourd'hui
 Synthèse seulement
 Antériorité (jours) 0
 Nombre jours 2
 1 tranche = 1 heure(s)
 Largeur tranche 48

> GENERAL
 Affichage automatique - 00:10 +
 Ancrer en haut
 Afficher chiffres

Synthèse graphique
 Prescrire Résultats
 Analyse Vidal
 Afficher en DCI
 Analyse vidal globale
 Résumé Vidal
 09/01/25 11:51
 Documents : Nouveau Liste Exporter

Bilan Hydrosodé

	Tous	J-1	J
Entrées presc	3 600	916	
Entrées réelles	2 228	333	
Sorties	1 600	83	
Bilan (E-S)	628	250	
Détails	Voir	Voir	
Calculer	Calc.	Calc.	
Derniers calculs	09/01/25 11:51	09/01/25 11:17

Paramètre	4h	8h	12h	16h	18h	19h
T°	36°C	37,4°C	36°C	36,7°C	36°C	36°C
Sonde urinaire	200 / 600	300 / 900	200 / 1100	100(V) / 1200	300	300
Glycémie	12	17	12,5	10,2	9,1	
Score de GLASGOW	8 (Y4V1M3)	8 (Y4V1M3)	7 (Y3V1M3)	7 (Y3V1M3)	5 (Y2V1M2)	5 (Y2V1M2)
Pupilles	(3,+)(3,+)	(3,+)(3,+)	(2,+)(2,+)	(3,+)(3,+)	(3,+)(3,+)	
Mouvements anormaux	oui raideur	non	non	non	non	non

> SEDATION - ANALGESIE - CURARE

Contexte : 1. Réanimation

Date d'affichage : 09/01/2025

Jeu di (Aujourd'hui)

-1 +1 Aujourd'hui

Semaine Par défaut

Synthèse seulement

Antériorité (jours) 0 - +

Nombre jours 2 - +

1 tranche = 1 heure(s)

Largeur tranche 48 - +

Synthèse graphique

Prescrire Résultats

Analyse Vidal Afficher en DCI

Analyse vidal globale

Résumé Interaction 12

Vidal Redondance 2

09/01/25 Phy-Chim. 3

11:51 Posologie 5

Documents :

Nouveau Liste Exporter

Dos
05/01/25 15:14
SPE + Installation matelas air alpha 5

Cheville gauche
05/01/25 15:15
Pied gauche
05/01/25 15:15
SPE + installation matelas air

Pied droit
05/01/25 15:16
SPE + Matelas air

Contrôle de la ventilation

- Surveillance du système de ventilation (Respirateur - Circuit - Interface), vérification des dates de pose.
- Contrôle des alarmes du respirateur
- Vérification du repère de la SOT ; ne doit pas bouger.
- Vérification du ballonnet : + 30mm de hg
- Vérification / changement de la lacette
- Contrôle de la concordance des paramètres de ventilation de la prescription médicale
- Relevé des constantes respiratoires
- Relevé de l'Et CO2
- Recherche des critères de sevrabilité (le matin)
- Mon patient est il adapté au mode de ventilation choisi.

Fermer Déconnexion Surveillances et Prescriptions Soins, Régimes, Isolement, autres Dispositifs, EER Vue Patient Ajouter évènement Nouveau Feuillet

Dossier d'Admission Observation médicale Lit : 1.65 A

NIP : 675266 Sexe : M Age : 61 ans IDE LA COSTE DE FONTENILLES I. ASD BESSAA C. IDE THOMAS A. Jeudi 09 (Aujourd'hui) ASD : 7-19h

Bilan E/S Transmission Poids entrée : 82 kg Poids : 82,5 kg (6 J) le : 04/01/2025 Conclusion Admission : Taille : ? IGSII : ?

Impressions Autres Ecrans... Allergies : Aucune allergie renseignée Poids idéal théorique : ? IMC : ? JOp : - J14

Contexte : 1. Réanimation Date d'affichage : 09/01/2025 Jeudi (Aujourd'hui)

-1 +1 Aujourd'hui

Semaine Par défaut Prescr. désencombrement 1 jour validée

Synthèse seulement Presc. mob./réhab. 1 jour validée

Antériorité (jours) 0 - + Mobilisation-Réhabilitation 1 jour

Nombre jours 2 - +

1 tranche = 1 heure(s)

Largeur tranche 48 - +

Synthèse graphique

Prescrire Résultats

Analyse Vidal Afficher en DCI

Analyse vidal globale

Résumé Vidal 09/01/25 11:51

Documents : Nouveau Liste Exporter

Position du patient 4h DD 45° DD 30° DD 30° DD 30° DD 45° DD 45°

Contention 4h pas de contention pas de contention

> KINESITHERAPIE

Prescr. désencombrement 1 jour validée

Presc. mob./réhab. 1 jour validée

Mobilisation-Réhabilitation 1 jour

> INTERFACE RESPIRATOIRE

Interface 4h IOT IOT IOT IOT IOT IOT

> VENTILATION MECANIQUE

Aspiration endo-trachéale 4h ++, purulent purulent ++, purulent ++, purulent, collant

Mode ventilatoire 4h VSAI-PEP VSAI-PEP VSAI-PEP VSAI-PEP VSAI-PEP VSAI-PEP

Vti 387	Vti 677	Vti 363	Vti 807	Vti 854
Vte 420	Vte 565	Vte 330	Vte 713	Vte 821
FR respi 32	FR respi 31	FR respi 40	FR respi 20	FR respi 29
VMe 13	VMe 14,6	VMe 13,2	VMe 9,3	VMe 8,51
AI 6				
PEP 5				
Pcrête 12	Pcrête 13	Pcrête 11	Pcrête 12	Pcrête 14
FiO2 21	FiO2 21	FiO2 21	FiO2 21	FiO2 30

CO2e 4h

Sueurs - Tirage 4h ,0 front ,0

Modes ventilatoires Intubé W Gaz du sang

Mode permanent VSAI-PEP 09/01/25 10:19

FiO2 : 21

PEEP : 5

AI : 6

Pente : 0,05

Mode intermittent

Médicaments Afficher prescriptions terminées (1) Bilan E/S Afficher par classe thérapeutique

Perfusion +

IVSE +

Vérification des thérapeutiques

- Concordance entre ce qui passe et ce qui est prescrit : Type - Débit - Electrolytes - Date de préparation - Date de changement des tubulures
- Compatibilité des traitements IV (quoi sur quelle voie)
- Préparation des nouvelles thérapeutiques

Surveillance des voies d'abord

- Contrôle des pansements : propre et occlusif
- Dates de réfection
- Présence des points fixés
- Présence d'un retour sur Voie veineuse et KT art (quand les thérapeutiques le permettent) :
-> Pression / Zero / Flush
- Rinçage pulsé sur Voie Veineuse

Suivi matériel
 Pansements & Drainages
 Suivi escarres
 Historique
 Tout KT avec bactério
 KT
 Intubation
 Sonde vésicale
 Sonde Gastrique

Contexte: 1. Réanimation
 Date d'affichage: 09/01/2025
 Jeudi (Aujourd'hui)
 -1 +1 Aujourd'hui
 Semaine Par défaut
 Synthèse seulement
 Antériorité (jours) 0 - +
 Nombre jours 2 - +
 1 tranche = 1 heure(s)
 Largeur tranche 48 - +
 Synthèse graphique
 Prescrire Résultats
 Analyse Vidal
 Afficher en DCI
 Analyse vidal globale
 Résumé Interaction 12
 Vidal Redondance 2
 09/01/25 Phy-Chim 3
 11:51 Posologie 5
 Documents: Nouveau Liste Exporter

IOT / INT J14

- 09/01/25 20:00
- 09/01/25 08:00
- 27/12/24 00:24 Voir plus ...

Sonde gastrique J14

- 09/01/25 22:58
- 09/01/25 08:00
- 27/12/24 00:25 Voir plus ...

Sonde urinaire J14

- 09/01/25 22:58
- 09/01/25 10:00
- 26/12/24 08:08 Voir plus ...

VVP 2 gauche J5

- 09/01/25 22:58
- 09/01/25 08:00
- 04/01/25 19:12 Voir plus ...

Surveillance digestive :

- Surveillance de la sonde entérale : repère, fonctionnalité (aspi siphonnage) modèle de sonde
- Concordance des solutés d'alimentation entérale avec la prescription médicale (Type - Débit - Date de changement de la tubulure)

Fermer **Déconnexion** **Surveillances et Prescriptions** **Soins, Régimes, Isolement, autres** **Dispositifs, EER** **Vue Patient** **Ajouter évènement** **Nouveau Feuillet**

Dossier d'Admission: Observation médicale
 Bilan E/S: Transmission
 Impressions: Autres Ecrans...

Lit : 1.65 **A** **IDE LA COSTE DE FONTENILLES I.** **ASD BESSAA C.** **IDE THOMAS A.** **Jeudi 09 (Aujourd'hui)** **ASD : 7-19h** **IGSII : ?**

NIP : 675266 Sexe : M Age : 61 ans
 Poids entrée : 82 kg Poids : 82,5 kg (6 J) le : 04/01/2025
 Conclusion Admission : Taille : ?
 Allergies : Aucune allergie renseignée
 Poids idéal théorique : ? IMC : ? JOp : - **J14**

Contexte : **1. Réanimation**
 Date d'affichage : 09/01/2025
 Jeudi (Aujourd'hui)
 -1 **Aujourd'hui** +1
 Semaine Par défaut
 Synthèse seulement
 Antériorité (jours) 0 - +
 Nombre jours 2 - +
 1 tranche = 1 heure(s)
 Largeur tranche 40 - +
 Synthèse graphique
 Prescrire Résultats
 Analyse Vidal
 Afficher en DCI
 Analyse vidal globale
 Résumé Vidal
 09/01/25
 11:51
 Intéraction 12
 Redondance 2
 Phy-Chim. 3
 Posologie 5

Voie entérale **+** **★**

V Eau - pour hydratation entérale
 500 mL 1 fois par jour. Commence à 14h. A passer sur 24h.

L Nut. ent. fibre = SONDALIS STANDARD FIBRE
 1000 mL 2 fois par jour. Commence à 22h. A passer sur 16h.

L Nut. ent. ISocal = SONDALIS STANDARD
 500 mL 1 fois par jour. A passer sur 8h.

Lansoprazole 15mg cp (SNG)
 15 mg matin.

Bisoprolol 1.25mg
 1 cp matin, 1 cp soir.

Atorvastatine 40mg
 2 cp soir.

Ticagrelor 90 mg = BRILIQUE
 90 mg matin, 90 mg soir.

Aspirine 75mg = KARDEGIC
 1 sachet matin.

Paracetamol 1 g cp efferv
 1 cp 4 fois par jour.
Systématique.

Macrogol - = MOVICOL
 2 sachets matin, 2 sachets midi.
 pour 1 selle par jour.
A bien donner si besoin car reprise morphine pour inconfort.

Morphine sulfate LI 10mg/5ml = ORAMORPH
 6 mg 8 fois par jour.
 si BPS > 3.
Echelle BPS > 3.

URBANYL 5mg géli (Clobazam)
 1 gélule soir.

Voie inhalée **+** **★**

Bain de bouche **+** **★**

1000mL **13:05** **14:30** **14:00** **15mg** **1cp** **1cp** **90mg** **1sachet** **1cp** **14:00** **2sachet** **12:00** **6mg/3ml** **6mg/3ml** **6mg/3ml** **11:00** **14:00** **17:00** **18:00** **18:00** **18:00** **18:00**

Mais le plus des outils outils : ce sont vos
yeux!

**Regardez
votre
patient**