Mme Nicole , IPP

Signée le **29/08/2024 09:26** par - Venue **24A1759** dans l'UF: **HJ Conventionnel: HJ4**

le 29/08/2024 à 09:32 par

Clairance : 136.61 ml/min, Créatinémie : 46 µmol/l, Indice de masse corporelle : 19.72 kg/m2, Poids : 57 kg, Surface corporelle : 1.641 m2, Taille : 170 cm

Début le	Item	F.G.	Posologie

Chimiothérapie - AVASTIN 15MG / Kg (4 cures) 006 bis
Cure n° 1 du 08/08/2024 au 10/10/2024

Séquence n° 3 Feu vert médecin : le 19/09/2024 10:43

J43 le 19/09/2024

! **Risque de choc anaphylactique avec l'avastin.**

Faire pratiquer une protéinurie avant l'administration de l'avastin.Si l'analyse d'urine est > 2+, prescrire une protéinurie sur 24h et vérifier l'absence de syndrome néphrotique avant d'administrer l'avastin.

J43-H0 **Perfusion** INTRAVEINE **à passer sur 2h**
NACL 0,9% 250ML POCHE 250 ML
Garde veine utilisé pour le rinçage après chaque administration.

J43-H0 **Bandelette urinaire**
Recherche protéines urinaires avant administration avastin :si analyse > 2+ : avis médical.

J43-H0 **Tension artérielle / Fréquence cardiaque**
! *Surveillance pouls et tension avant la perfusion de bévacizumab.*

J43-H0 **Perfusion** INTRAVEINE **à passer sur 90mn**
BEVACIZUMAB 15 MG/kg **855 MG** de **Mvasi 25 mg/ml**
SODIUM CHLORURE 100 ML **100 ML** de NACL 0,9% 100ML POCHE
Perfusion en 1h30 lors de la 1ére cure, si bonne tolérance réduction à 1h lors de la 2ème cure et 30 min lors de la 3ème.
! *Incompatibilité du bévacizumab avec le glucose 5%.*

J43-H0+30 **Tension artérielle / Fréquence cardiaque**
! *Surveillance pouls et tension pendant la perfusion de bévacizumab.*

J43-H1+30 **Tension artérielle / Fréquence cardiaque**
! *Surveillance pouls et tension à la fin de la perfusion de bévacizumab.*

Me née , IPP : :

Signée le **29/08/2024 09:26** par - Venue **24A1759** dans l'UF: **HJ Conventionnel: HJ4**

le 29/08/2024 à 09:32 par Dr. LALOI LOUISE

Clairance : 136.61 ml/min, Créatinémie : 46 µmol/l, Indice de masse corporelle : 19.72 kg/m2, Poids : 57 kg, Surface corporelle : 1.641 m2, Taille : 170 cm

Début le	Item	F.G.	Posologie

Chimiothérapie - CARBO PACLITAXEL (CHATELUT) (1 cure) AGF 010
Cure n° 7 du 29/08/2024 au 29/08/2024

Séquence n° 1 — Feu vert médecin : . — le 29/08/2024 09:26

J1 le 29/08/2024

J1-H0 **Perfusion** — INTRAVEINE — **à passer sur 4h**
GLUCOSE 5% 500ML POCHE — 500 ML
Vérifier auprès du patient, que la prise de 8 MG de zophren per os, le matin de la chimio , a été convenablement réalisée.
Garde veine utilisé pour le rinçage après chaque administration.

J1-DJ **ONDANSETRON** — INTRAVEINE 8 MG
8 MG de **ONDANSETRON INJ 8MG/4ML**
Uniquement si : **Le patient a oublié sa prémédication de zophren per os.**

J1-H0 **DEXAMETHASONE** — INTRAVEINE 20 MG
20 MG de **DEXAMETHASONE MYLAN 20MG/5ML SOL INJ**

J1-H0 **DEXCHLORPHENIRAMINE** — INTRAVEINE 5 MG
5 MG de **POLARAMINE 5MG/1ML SOL INJ**

J1-H0 **RANITIDINE** — INTRAVEINE 50 MG
50 MG de **AZANTAC 50MG/2ML SOL INJ AMP**

J1-H0+30 **Tension artérielle / Fréquence cardiaque**
Surveillance pouls et tension avant la perfusion de paclitaxel.

J1-H0+30 **Perfusion** — INTRAVEINE — **à passer sur 3h**
CT PACLITAXEL — 140 MG/m2 — **229.74 MG** de **PACLITAXEL 6MG/ML 100ML**
GLUCOSE — 500 ML — **500 ML** de GLUCOSE 5% 500ML POCHE
Utliser une poche sans PVC et une tubulure de perfusion sans PVC + filtre 0.22 µm

J1-H2 **Tension artérielle / Fréquence cardiaque**
Surveillance pouls et tension pendant la perfusion de paclitaxel.

J1-H3+30 **Tension artérielle / Fréquence cardiaque**
Surveillance pouls et tension à la fin de la perfusion de paclitaxel.

J1-H3+30 **Perfusion** — INTRAVEINE — **à passer sur 1h**
CT CARBOPLATINE — 5 MG par Chatelut — **816.536 MG** de **CARBOPLATINE 10MG/ML 60ML**
GLUCOSE — 500 ML — **500 ML** de GLUCOSE 5% 250ML POCHE